



## مقاله پژوهشی

## ارزیابی تحمل به خشکی در هیبریدهای تست کراس چندرقد تحت شرایط تنش کم‌آبیاری

حسن حمیدی<sup>۱</sup>، سیده ساناز رمضانپور<sup>۲\*</sup>، مسعود احمدی<sup>۳</sup>، حسن سلطانلو<sup>۴</sup>

۱. دانش آموخته‌ی دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
۲. دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
۳. دانشیار بخش تحقیقات چندرقد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد

تاریخ دریافت: ۹۷/۱۱/۲۱؛ تاریخ پذیرش: ۹۸/۰۱/۱۷

## چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی تحمل به خشکی هیبریدهای تست کراس چندرقد (۵۷ هیبرید) به همراه هفت شاهد (ارقام IR7 ماندارین، جلگ، پایا، فتورا، SC-SB36) و جمعیت اصلاحی اولیه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح لاتیس نامتعادل (۸×۸) با چهار تکرار در سال زراعی ۱۳۹۵ انجام شد. آبیاری‌ها تا مرحله تنک و وجین (استقرار بوته‌ها) به‌طور معمول انجام شد. آبیاری‌های بعدی در شرایط بدون تنش پس از ۹۰ میلی‌متر و در شرایط تنش کم‌آبیاری پس از ۲۰۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخر کلاس A صورت گرفت. صفات موردمطالعه شامل عملکرد ریشه، درصد قند، عملکرد شکر، میزان سدیم، میزان پتاسیم، میزان نیتروژن مضره، ضریب قلیاتیت، درصد قند ملاس، شکر قابل استحصال، عملکرد شکر سفید و ضریب استحصال شکر بود. نتایج تجزیه واریانس مركب نشان داد که از نظر کلیه صفات بین ژنتیک‌های موربدبررسی و رژیم‌های مختلف آبیاری تفاوت معنی‌داری در سطح یک درصد وجود دارد. بیشترین عملکرد شکر سفید در شرایط بدون تنش و تنش کم‌آبیاری به ترتیب در هیبرید 73-S1-S1\*(SB36-7112) (۱۳/۳۴ تن در هکتار و رقم شاهد ماندارین به میزان ۹/۳۷ تن در هکتار، مشاهده گردید. تجزیه همبستگی بینگر رابطه مثبت و معنی‌دار بین عملکرد شکر سفید با عملکرد ریشه، درصد قند، عملکرد شکر، شکر قابل استحصال و ضریب استحصال شکر و همچنین همبستگی منفی و معنی‌دار با میزان سدیم، پتاسیم، ضریب قلیاتیت و درصد قند ملاس تحت هر دو شرایط بود. بر اساس نتایج تجزیه رگرسیون گام‌به‌گام صفات عملکرد شکر، ضریب استحصال شکر، عملکرد ریشه و درصد قند بیش از ۹۹ درصد تغییرات عملکرد شکر سفید را در هر دو شرایط (بدون تنش و تنش کم‌آبیاری) توجیه کردند. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط عدم تنش عملکرد ریشه (۱/۱۷) و در شرایط تنش نیز عملکرد شکر (۰/۸۹) بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد شکر سفید داشته‌اند. درنهایت، در بین هیبریدهای موردمطالعه، هیبریدهای 73-S1-S1\*(SB36-7112)، 72-S1-S1\*(SB36-7112) و 66-S1-S1\*(SB36-7112) که هم از لحاظ شاخص تحمل به تنش (STI) و هم از لحاظ صفات عملکردی در شرایط تنش برتر بودند به عنوان متتحمل‌ترین هیبریدها به تنش خشکی معرفی شدند.

واژه‌های کلیدی: تنش خشکی، شاخص تحمل به تنش، عملکرد شکر سفید، هیبرید.

## مقدمه

تا سال ۲۰۵۰ عملکرد محصولات کشاورزی را در ۵۰ درصد زمین‌های کشاورزی جهان با خطر جدی مواجه سازد که این امر موجب کاهش چشمگیر تولید محصولات غذایی خواهد شد (Ahmad et al., 2014).

گیاهان در مراحل مختلف رشد و نمو خود با تنش‌های زیستی و غیر زیستی مواجه می‌شوند. در این‌بین تنش خشکی مهم‌ترین عامل غیر زیستی است که با گرم شدن کره زمین و بیشتر شدن احتمال رخداد خشکسالی، پیش‌بینی می‌شود

همدان نشان دادند که قطع آبیاری در اواخر دوره رشد چندرقند، باعث کاهش خصوصیات کیفی شامل عیار قند، عیار قند خالص و راندمان استحصلال می‌شود. علاوه بر این تنش رطوبتی در اواخر دوره رشد چندرقند باعث افزایش ناخالص‌های ریشه چندرقند ازجمله پتاسیم و سدیم شده و درنتیجه راندمان استحصلال قند ریشه را به طور معنی‌داری کاهش و درصد قند ملاس را افزایش می‌دهد.

غفاری و همکاران (Ghafari et al., 2016) هیبرید جدید منژرم چندرقند را از نظر تحمل به خشکی مورد ارزیابی قرار دادند. آن‌ها هفت هیبرید را که از لحاظ ساختار STI و هم از لحاظ صفات عملکردی در شرایط تنش (۲۰۰ میلی‌متر تبخیر از تشک تبخیر کلاس A) برتر بودند، به عنوان متحمل‌ترین هیبریدها به تنش خشکی معرفی کردند.

صادق زاده حمایتی و فصاحت (Sadeghzadeh Hemayati and Fasahat, 2016) با ارزیابی تحمل به خشکی ۳۶ ژنوتیپ چندرقند در کرج گزارش کردند که تحت تنش خشکی (۲۷۰ میلی‌متر تبخیر از تشک تبخیر کلاس A)، میانگین عملکرد ریشه، شکر خام و شکر سفید به ترتیب معادل ۵۹، ۷۲ و ۷۶ درصد کاهش یافت.

عبدالهیان نوعلی و همکاران (Abdollahian Noghabi et al., 2011) با ارزیابی تنوع ژنتیکی چندرقند تحت شرایط تنش خشکی شدید پس از استقرار بوته در کرج نشان دادند که بین ژنوتیپ‌ها از نظر عملکرد ریشه، عملکرد شکر، عملکرد شکر سفید، درصد قند و نیتروژن مضره تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. تجزیه رگرسیون خطی گام‌به‌گام نشان داد که چهار صفت عملکرد ریشه، درصد قند، عملکرد شکر و شکر قابل استحصلال به طور معنی‌داری تعییرات عملکرد شکر سفید را توجیه می‌کند.

هدف از این پژوهش ارزیابی هیبریدهای تست کراس چندرقند تحت شرایط بدون تنش و تنش کم‌آبیاری در شرایط آب و هوایی استان خراسان رضوی به منظور گزینش هیبریدهای امیدبخش و متحمل به خشکی است.

### مواد و روش‌ها

این پژوهش در سال زراعی ۱۳۹۵-۹۶ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق (مشهد) طی دو آزمایش جداگانه در قالب طرح لاتیس نامتعادل (۸×۸) در چهار تکرار با استفاده از ۶۴ ژنوتیپ چندرقند شامل ۵۷ هیبرید تست کراس چندرقند

کم‌آبیاری یک راهکار بهینه برای به عمل آوردن محصولات تحت شرایط کمبود آب است. کم‌آبیاری اگرچه موجب کاهش عملکرد می‌گردد، اما باستی در نظر داشت که کاهش عملکرد بستگی به زمان اعمال تنش کم‌آبیاری دارد. کم‌آبیاری ممکن است علاوه بر صرف‌جویی در مصرف آب، باعث کاهش بیماری‌ها و آفات، به حداقل رساندن آبشویی کودها از منطقه ریشه و بهبود تهویه خاک گردد. گیاهان زراعی مختلف ممکن است عکس‌العمل‌های متفاوتی در مقابل کم‌آبیاری و درنتیجه تنش کم‌آبی از خود نشان دهند (Kheirabi, 1995).

گیاه چندرقند معمولاً نسبت به تنش‌های رطوبتی در اوایل دوره رشد حساس است و اگر تنش رطوبتی در مراحل بعدی رشد حادث شود قادر است آن را تا حدی تحمل نماید، اگرچه این تنش‌ها نیز خسارت زیادی به محصول وارد می‌کنند (Hekamat Shoar, 1992). به طور کلی میزان حساسیت گیاه بستگی به گونه، رقم، روش و مدیریت آبیاری و مرحله‌ای از رشد گیاه که کم‌آبیاری اعمال می‌گردد، بستگی دارد (Kirda, 2002).

انتخاب ژنوتیپ‌ها بر اساس عملکرد تحت هر دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی منجر به شناسایی ژنوتیپ‌های دارای عملکرد بالا می‌گردد (Gavuzzi et al., 1997). عروج نیا و همکاران (Oroojnia et al., 2012) در آزمایشی روی ۱۵ ژنوتیپ هافسیب (خانواده نیمه خواهری) پلی‌ژرم دیپلوبئید چندرقند تحت شرایط بدون تنش (۸۰ میلی‌متر تبخیر از تشک تبخیر کلاس A) و تنش خشکی (۱۸۰ میلی‌متر تبخیر از تشک تبخیر کلاس A)، اختلاف معنی‌داری را بین سطوح مختلف آبیاری و ژنوتیپ‌های مورد آزمایش از نظر صفات کمی و کیفی گزارش کردند. فروزش و همکاران (Foroozesh et al., 2012) در تحقیقی روی ۱۴ ژنوتیپ چندرقند تحت شرایط تنش خشکی (۱۸۰ میلی‌متر تبخیر از تشک تبخیر کلاس A) و بدون تنش (۸۰ میلی‌متر تبخیر از تشک تبخیر کلاس A) اظهار داشتند که ژنوتیپ‌های موردنبررسی از نظر عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید تفاوت معنی‌داری ندارند اما از نظر صفت محتوای شکر سفید تفاوت معنی‌داری بین ژنوتیپ‌ها مشاهده شد. میرزابی و رضوانی (Mirzaee and Rezvani, 2007) با بررسی اثرات تنش خشکی (قطع یک تا چهار بار آبیاری) در مراحل مختلف رشد رویشی چندرقند (مراحل رشد برگی، رشد ریشه و ذخیره‌سازی قند در ریشه) و استفاده بهینه از مصرف آب در

به منظور تعیین میزان تحمل ژنوتیپ‌های چغندر قند به تنفس خشکی، تعداد ۶۴ ژنوتیپ تحت شرایط بدون تنفس ۹۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس (A) و تنفس کم‌آبیاری (۲۰۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس (A)) مورد ارزیابی قرار گرفتند (Ghafari et al., 2016). در مرحله ۴-۶ برگی به منظور ایجاد تراکم ۱۰۰ هزار بوته در هکتار، گیاه‌چهای سبز شده تنک شدند. تا مرحله تنک و وجین (استقرار بوته‌ها) آبیاری به طور معمول و به صورت نشی انجام شد. با توجه به شرایط آب و هوایی مشهد و بافت خاک مزرعه، در شرایط بدون تنفس هر ۹ روز یکبار و در شرایط تنفس کم‌آبیاری هر ۱۸ روز یکبار آبیاری انجام شد. بر این اساس تعداد دفعات آبیاری در شرایط بدون تنفس و تنفس کم‌آبیاری به ترتیب ۱۴ و ۸ نوبت بود. مجموع میزان آب مصرفی در تیمار بدون تنفس ۸۳۰۰ مترمکعب و در تیمار تنفس کم‌آبیاری برابر ۱۳۱۰۰ مترمکعب در هکتار برآورد گردید. کوددھی (بر اساس آزمون خاک)، کنترل شیمیایی آفات و بیماری‌های (بر اساس بازدیدهای منظم) و وجین دستی علف‌های هرز به‌گونه‌ای انجام شد تا مزرعه عاری از هرگونه تنفس کمبود عناصر غذایی و خسارت عوامل زنده محیطی باشد.

به همراه هفت شاهد (ارقام IR7، ماندارین، جلگه، پایا، فتورا، SC (7112\*SB36) و جمعیت اصلاحی اولیه) انجام شد. در این تحقیق، ارقام شاهد IR7، ماندارین، پایا و فتورا به عنوان ارقام متحمل به خشکی و رقم جلگه به عنوان رقم حساس به خشکی مورد استفاده قرار گرفت. نام و کد ژنوتیپ‌های چغندر قند مورد مطالعه در جدول ۱ نشان داده شده است. لازم به ذکر است که هیبریدهای تست کراس مورد مطالعه از تلاقی SC (7112\*SB36) به عنوان والد مادری مشترک با لاین-های مختلف بدست آمده‌اند که این لاین‌ها از یک نوده مقاوم به خشکی (BP-Mashhad) و به صورت فامیل‌های فول سیب (Ahmadi et al., 2011) تهیه شده بودند (S1).

ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق در شهر مشهد با عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۱۶ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۹ درجه و ۳۸ دقیقه شرقی و ارتفاع از سطح دریا ۹۹۹ متر، واقع شده است. میانگین درازمدت دمای روزانه ۱۴/۱ میانگین حداقل و حداً کثر دما به ترتیب ۷/۱ و ۲۱/۱ درجه سانتی‌گراد با میانگین بارش ۲۵۰ میلی‌متر در سال است. میزان بارندگی ماهانه در طول دوره رشد در جدول ۲ و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول ۱. اسامی و کد ژنوتیپ‌های چغندر قند مورد مطالعه

Table 1. Names and code of studied sugar beet genotypes

کد ژنوتیپ Genotype code.	نام ژنوتیپ Genotype Name	کد ژنوتیپ Genotype code.	نام ژنوتیپ Genotype Name	کد ژنوتیپ Genotype code.	نام ژنوتیپ Genotype Name
1	(7112*SB36)*S1-28	23	(7112*SB36)*S1-31	45	(7112*SB36)*S1-63
2	(7112*SB36)*S1-55	24	(7112*SB36)*S1-2	46	(7112*SB36)*S1-90
3	(7112*SB36)*S1-49	25	(7112*SB36)*S1-5	47	(7112*SB36)*S1-84
4	(7112*SB36)*S1-12	26	(7112*SB36)*S1-6	48	(7112*SB36)*S1-61
5	(7112*SB36)*S1-48	27	(7112*SB36)*S1-94	49	(7112*SB36)*S1-15
6	(7112*SB36)*S1-45	28	(7112*SB36)*S1-93	50	(7112*SB36)*S1-4
7	(7112*SB36)*S1-44	29	(7112*SB36)*S1-56	51	(7112*SB36)*S1-73
8	(7112*SB36)*S1-39	30	(7112*SB36)*S1-8	52	(7112*SB36)*S1-16
9	(7112*SB36)*S1-21	31	(7112*SB36)*S1-22	53	(7112*SB36)*S1-71
10	(7112*SB36)*S1-42	32	(7112*SB36)*S1-7	54	(7112*SB36)*S1-70
11	(7112*SB36)*S1-77	33	(7112*SB36)*S1-89	55	(7112*SB36)*S1-3
12	(7112*SB36)*S1-86	34	(7112*SB36)*S1-19	56	(7112*SB36)*S1-72
13	(7112*SB36)*S1-40	35	(7112*SB36)*S1-37	57	(7112*SB36)*S1-88
14	(7112*SB36)*S1-38	36	(7112*SB36)*S1-32	58	SC (7112*SB36)
15	(7112*SB36)*S1-18	37	(7112*SB36)*S1-54	59	Paya
16	(7112*SB36)*S1-20	38	(7112*SB36)*S1-53	60	IR7
17	(7112*SB36)*S1-26	39	(7112*SB36)*S1-92	61	Mandarin
18	(7112*SB36)*S1-36	40	(7112*SB36)*S1-66	62	جمعیت اصلاحی اولیه
19	(7112*SB36)*S1-46	41	(7112*SB36)*S1-10	63	Parental population
20	(7112*SB36)*S1-69	42	(7112*SB36)*S1-76	64	Fotora
21	(7112*SB36)*S1-57	43	(7112*SB36)*S1-100		Jolgeh
22	(7112*SB36)*S1-17	44	(7112*SB36)*S1-13		

جدول ۲. مقدار بارندگی ماهانه در طول دوره رشد چغندرقند (بر حسب میلی‌متر) در سال ۱۳۹۵

Table 2. Rate of month rainfall in duration of sugar beet growth stage (mm) in 2016

آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین
October	September	August	July	June	May	April	March
2	0	0	0	6.6	41.3	94.6	

جدول ۳. مشخصات فیزیکی و شیمیابی خاک مزرعه آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق - مشهد در سال ۱۳۹۵  
Table 3. Physical and chemical properties of the experimental farm soil at the Agricultural and Natural Resources Research Station of Toroq-Mashhad in 2016

Soil depth	Soil texture	عمق خاک	بافت خاک	درصد اشباع	هدايت	پتانسیم	فسفر		
				کلتریکی	نیتروژن کل	قابل جذب	قابل جذب		
				EC (dS/m)	pH	K ava (mg/kg)	P.ava (mg/kg)		
0-30	Silty Loam	32.8		1.7	7.9	0.05	210	11.6	0.4
30-60	Loam	33.6		2.1	8	0.06	195	8.3	0.3

با استفاده از رگرسیون گام به گام مهم‌ترین صفات مؤثر بر عملکرد شکر سفید و توحیه بهتر روابط تعیین شد. سپس برای تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بر عملکرد شکر سفید، تجزیه علیت انجام گردید. برای بررسی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های چغندرقند، شاخص‌های متفاوتی پیشنهاد شده است اما اکثر محققین اظهار داشته‌اند که شاخص تحمل به تنش (STI) به علت همبستگی معنی‌دار و مثبت با عملکرد شکر سفید در شرایط مطلوب و تنش خشکی و همچنین همبستگی مثبت و معنی‌دار با شاخص میانگین حسابی عملکرد (MP) نسبت به شاخص‌های دیگر پیشنهاد Sadeghian et al., 2000; Parvizi (1997) مناسب‌تری است (Almani et al., 1997). بهمنظور برآورد شاخص تحمل تنش از عملکرد شکر سفید ژنوتیپ‌ها در شرایط بدون تنش (WSY<sub>n</sub>) و عملکرد شکر سفید ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش (WSY<sub>s</sub>) و با استفاده از فرمول ۷ استفاده گردید کم‌آبیاری (Fernandez, 1992)

$$STI = (WSY_n \times WSY_s) / (\overline{WSY}_n)^2 \quad [7]$$

در فرمول ذکر شده،  $\overline{WSY}_n$  میانگین عملکرد شکر سفید کلیه ژنوتیپ‌ها در شرایط بدون تنش است. تجزیه واریانس برای تمامی صفات به صورت طرح لاتیس انجام شد. به دلیل آنکه کارایی نسبی طرح لاتیس نسبت به طرح بلوک‌های کامل تصادفی برای تمامی صفات نسبتاً برابر و در ضمن نیازی به تصحیح اثر تیمارها برای اثر بلوک‌های

عملیات برداشت با استفاده از دستگاه چغندرکن پشت تراکتوری انجام شد. خطوط حاشیه‌ای آزمایش و نیم متر از ابتدا و انتهای هر کرت حذف گردید. ریشه‌های چغندرقند پس از سرزنی و شستشو تو زین گردید و میزان عملکرد نهایی ریشه (بر اساس وزن تر) بر حسب تن در هکتار محاسبه شد. سپس با دستگاه اتوماتیک ونما (VENEMA) خمیر ریشه تهیه و صفات کیفی اندازه‌گیری شد. صفاتی از قبیل درصد قند یا عیار قند (SC) به روش پلازیمتری، مقدار پتانسیم (K) و سدیم (Na) به روش فلیم فوتومتری و مقدار نیتروژن مضره (a-N) به روش عدد آبی و بر حسب میلی اکی - والان در ۱۰۰ گرم خمیر ریشه چغندرقند اندازه‌گیری شد. همچنین صفاتی از قبیل ضربی قلیائیت (Alc)، عملکرد شکر عملکرد شکر سفید (WSY) و ضربی استحصال شکر (ECS) Abdollahian نیز از طریق روابط زیر محاسبه گردید (Noghabi et al., 2005

$$Alc = (K + Na) / (a - N) \quad [1]$$

$$SY = RY \times SC \quad [2]$$

$$MS = 0.343(K + Na) + 0.094(a - N) - 0.31 \quad [3]$$

$$WSC = SC - (MS + 0.6) \quad [4]$$

$$WSY = WSC \times RY \quad [5]$$

$$ECS = (WSC / SC) \times 100 \quad [6]$$

جدول ۴ ارائه شده است. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر ژنوتیپ‌ها و محیط‌های مختلف (شرایط آبیاری) و همچنین اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر کلیه صفات موردمطالعه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود (جدول ۴). به علت وجود اثرات متقابل معنی‌دار ژنوتیپ × محیط، اصلاح گیاهان زراعی برای سازگاری به دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی، اگرچه غیرممکن نیست، اما بسیار دشوار است. در برنامه‌های بهزادی به طور معمول، ژنوتیپ‌هایی به عنوان سازگار شناخته می‌شوند که واریانس اثر متقابل آن‌ها با محیط اندک باشد (Yan and Kang, 2002).

در این تحقیق از نظر کلیه صفات موردنبررسی بین ژنوتیپ‌های موردمطالعه، تنوع ژنتیکی کافی وجود داشت، لذا با توجه به تنوع موجود می‌توان به ژنوتیپ‌های با عملکرد بالا دسترسی

ناقص نبود، تجزیه واریانس مرکب داده‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی برای تمامی صفات و با استفاده از داده‌های اصلی انجام شد. لازم به ذکر است که تجزیه واریانس مرکب آزمایش‌های موردمطالعه در دو محیط (عدم تنش و تنش کمآبیاری) پس از اطمینان از آزمون متجانس بودن واریانس خطاهای آزمایشی در محیط‌های موردمطالعه از طریق آزمون بارتلت انجام شد. تجزیه واریانس، مقایسه میانگین ژنوتیپ‌ها به روش LSD در سطح احتمال پنج و یک درصد، برآورد همبستگی‌ها و همچنین تجزیه رگرسیون گام‌به‌گام با نرم‌افزار آماری SAS 9.1 انجام شد. تجزیه علیت نیز با استفاده از نرم‌افزار Amos v19 انجام گردید.

### نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس صفات موردمطالعه در ژنوتیپ‌های چغندرقند در شرایط تنش کمآبیاری، بدون تنش و مرکب در

جدول ۴. نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقند در شرایط تنش کمآبیاری، بدون تنش و مرکب

Table 4. Results of analysis of variance (mean squares) for yield and yield components of different sugar beet genotypes under water deficit stress, normal and combined conditions

		منابع تغییرات	درجه آزادی df	عملکرد ریشه Root yield	درصد قند Sugar content (%)	عملکرد شکر Sugar yield	سدیم Na	پتاسیم K
مرکب Combined	Location (L)	محیط	1	45353.0 **	353.56 **	1111.4 **	85.764 **	27.574 **
	تکرار (محیط)	تکرار (محیط)	6	29.495	15.212	7.668	0.385	1.089
	Replication (Location)							
	Genotype (G)	ژنوتیپ	63	209.634 **	4.030 **	10.694 **	0.946 **	1.003 **
	L × G	ژنوتیپ × محیط	63	66.671 **	1.31 **	2.755 **	0.510 **	0.254 **
	Error	اشتباه آزمایشی	378	18.411	0.424	0.785	0.119	0.159
	CV (%)	ضریب تغییرات (%)		9.78	3.33	10.38	17.63	8.09
	Replication	تکرار	3	15.291 ns	30.256 ns	13.187 **	0.692 *	2.090 **
	Genotype	ژنوتیپ	63	154.920 **	1.811 **	6.631 **	0.271 **	0.518 **
	Error	اشتباه آزمایشی	189	21.688	0.580	0.861	0.175	0.239
بدون تنش Non-stress	CV (%)	ضریب تغییرات (%)		8.74	4.06	9.27	27.05	10.39
	کارایی طرح لاتیس به بلوك			97.11	100.52	95.55	100.39	96.26
	Efficiency							
	Replication	تکرار	3	43.099 ns	0.169 ns	2.149 *	0.078 ns	0.088 ns
	Genotype	ژنوتیپ	63	121.385 **	3.351 **	6.818 **	1.186 **	0.793 **
کمآبیاری Water deficit stress	Error	اشتباه آزمایشی	189	15.134	0.269	0.707	0.062	0.080
	CV (%)	ضریب تغییرات (%)		11.29	2.54	11.91	10.60	5.46
	کارایی طرح لاتیس به بلوك			96.95	96.85	95.15	94.42	102.26
	Efficiency							

Table 4. Continued

جدول ۴. ادامه

S.O.V.	منابع تغییرات	درجه آزادی df	نیتروژن مضره N	ضریب قلیائیت Alkalinity	درصد قند ملاس Molasses sugar (%)	استحصال White sugar content	شکر قابل استحصال White sugar yield	عملکرد شکر سفید	Extraction coefficient of sugar
Location (L)	محیط	1	37.579**	78.759**	30.850**	421.13**	1898.5**	1734.605**	
	تکرار (محیط)	6	29.495	0.060	0.194	0.473	6.661	3.932	
مرکب Combined	Replication (Location)	ژنتیپ (G)	63	0.356**	3.640**	0.413**	6.247**	8.942**	22.634**
	L × G	ژنتیپ × محیط	63	0.239**	1.178**	0.149 **	1.711**	2.087 **	8.452 **
	Error	اشتباه آزمایشی	378	0.020	0.318	0.104	0.291	0.565	0.560
	CV (%)	ضریب تغییرات (%)		20.44	11.18	14.72	3.31	10.36	0.88
Non-stress	Replication	تکرار	3	0.083ns	0.148ns	0.769**	13.195**	0.069ns	8.352**
	Genotype	ژنتیپ	63	0.114ns	2.487**	0.161**	2.697**	125.209**	7.453**
	Error	اشتباه آزمایشی	189	0.097	0.541	0.095	0.503	0.923	0.946
	CV (%)	ضریب تغییرات (%)		25.76	13.50	15.86	4.12	2.10	1.12
	کارایی طرح لاتیس به بلوک			95.74	97.13	93.11	102.25	99.84	100.04
	Efficiency								
کمآبیاری Water deficit stress	Replication	تکرار	3	0.038ns	0.239ns	0.176ns	0.128ns	1.357*	0.413ns
	Genotype	ژنتیپ	63	0.481**	2.332**	0.401**	5.262**	4.853**	23.633**
	Error	اشتباه آزمایشی	189	0.086	0.097	0.113	0.080	0.382	0.175
	CV (%)	ضریب تغییرات (%)		16.75	6.69	13.78	1.83	11.59	0.50
	کارایی طرح لاتیس به بلوک			101.32	103.06	98.38	101.79	94.86	93.58
	Efficiency								

ns, \*and\*\*: None significant and significant at 5 and 1%, Respectively.

\* و \*\* به ترتیب غیر معنی‌دار و معنی‌دار در سطح احتمال پنج و یک درصد

ns, \*and\*\*: None significant and significant at 5 and 1%, Respectively.

کمآبیاری معادل ۱۱/۵۵ تن در هکتار در رقم شاهد ماندارین بود. هیبرید ۵۶\*(SB36)\*S1-7112 (7112\*SB36) و رقم شاهد جلگه دارای بیشترین میزان سدیم به ترتیب در شرایط بدون تنش ۳/۶۹ (۲/۴۵ میلی‌اکی والان در ۱۰۰ گرم) و تنش کمآبیاری ۳/۶۹ (۲/۴۵ میلی‌اکی والان در ۱۰۰ گرم) بودند. بالاترین مقادیر پتاسیم در هیبرید ۶۹-S1\*(SB36) ۷۱۱۲ (7112\*SB36)\*S1-69 در شرایط بدون تنش ۶/۲۲ (۵/۸۰ میلی‌اکی والان در ۱۰۰ گرم) و تنش کمآبیاری ۶/۲۲ (۵/۸۰ میلی‌اکی والان در ۱۰۰ گرم) مشاهده شد. در هیبرید ۱۶-S1\*(SB36) ۷۱۱۲ (7112\*SB36)\*S1-16 بدون تنش به میزان ۱/۶۰ (۱۶۰ میلی‌اکی والان در ۱۰۰ گرم) مشاهده شد در حالی که هیبرید ۸۶-S1\*(SB36) ۷۱۱۲ (7112\*SB36)\*S1-86 دارای بیشترین میزان سدیم (۲/۷۰ میلی‌اکی والان در ۱۰۰ گرم) در شرایط تنش کمآبیاری بود. در شرایط بدون تنش و تنش کمآبیاری، بیشترین ضریب قلیائیت در رقم شاهد جلگه

پیدا کرد. وجود تنوع ژنتیکی بین ژنتیپ‌های چوندرقند تحت شرایط تنش خشکی از سوی سایر محققین نیز گزارش شده است (Hamidi et al., 2018; Abdollahian et al., 2011; Noghabi et al., 2013; Rajabi et al., 2013). مقایسه ژنتیپ‌ها از لحاظ عملکرد ریشه نشان داد که هیبرید ۷۳-S1\*(SB36) ۷۱۱۲ (7112\*SB36)\*S1-73 با عملکرد ریشه ۷۲/۰۷ تن در هکتار در شرایط بدون تنش و رقم شاهد ماندارین با عملکرد ریشه ۵۰/۳۳ تن در هکتار در شرایط تنش کمآبیاری دارای بیشترین مقادیر بودند. بیشترین درصد قند در شرایط بدون تنش و تنش کمآبیاری نیز در رقم شاهد ماندارین به ترتیب به میزان ۲۰/۹۸ و ۲۲/۹۸ درصد وجود داشت. بیشترین میزان عملکرد شکر در شرایط بدون تنش معادل ۱۴/۲۰ تن در هکتار در هیبرید ۷۳-S1\*(SB36) ۷۱۱۲ بود در صورتی که بیشترین میزان عملکرد شکر در شرایط تنش

راندمان استحصال قند ریشه را به طور معنی‌داری کاهش و درصد قند ملاس را افزایش می‌دهد. نتایج تحقیقات فتوحی و همکاران (Fotouhi et al., 2008) و اوضاضی زاده و همکاران (Orazizadeh et al., 2016) نیز نشان‌دهنده کاهش عملکرد ریشه و عملکرد شکر چغندرقدن در اثر تنش کم‌آبیاری است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اعمال تنش کم‌آبیاری منجر به افزایش درصد قند گردید. افزایش درصد قند بر اثر اعمال تنش کم‌آبیاری در تحقیقات نورجو و همکاران (Nourjoo and Baghaee Kia, 2004)، فتوحی و همکاران Koocheki (Fotouhi et al., 2008) و کوچکی و سلطانی (and Soltani, 1996) گزارش شده است. درصد قند یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفی در کشت چغندرقدن است. درصد قند تحت تأثیر نوع ژنتیپ و محیط آن می‌تواند مقادیر متفاوتی را داشته باشد (Khajehpur, 1998). با توجه به اینکه عملکرد قند تحت تأثیر دو صفت عملکرد ریشه و درصد قند است و افزایش هر یک از این صفات منجر به افزایش عملکرد قند خواهد شد، لذا تحقیقات نشان داده است که عملکرد ریشه بیشتر از درصد قند در تغییرات عملکرد قند نقش دارد (Orazizadeh et al., 2016). ذخیره قند و رشد ریشه به طور متناوب در طول دوره رشد صورت می‌گیرد. هرچند که اعمال تنش خشکی در برخی از موارد سبب افزایش درصد قند شده است ولی این قضیه کاملاً مرتبط با نوع ژنتیپ، زمان تنش و اثرات متقابل آن است. در طول فصل رشد اگر رطوبت بهاندازه کافی در دسترس گیاه نباشد، عملکرد محدود شده و نیتروژن مضره در ریشه افزایش می‌یابد (Koocheki et al., 2003). افزایش در مقادیر ساکارز و هگزوز به نظر می‌رسد به خاطر افزایش هیدرولیز نشاسته و سنتز ساکارز باشد. تجمع ساکارز و هگزوز به منظور ایفای نقش اسمزی در این گونه‌ها انجام می‌شود (Westage and Boyer, 1985).

میانگین عملکرد شکر سفید در شرایط بدون تنش و تنش کم‌آبیاری و همچنین مقدار عددی شاخص STI به عنوان شاخص تحمل به خشکی برای صفت مهم محصولی عملکرد شکر سفید برای ۵۷ هیبرید تست کراس و ارقام شاهد در جدول ۶ نشان داده شده است. هیبرید \* (7112 \* SB36) S1 - 73 و رقم شاهد ماندارین دارای بیشترین میزان عملکرد شکر سفید به ترتیب در شرایط نرمال (۱۳/۳۴ تن در هکتار) و تنش کم‌آبیاری ۹/۳۷ تن در هکتار) بودند. به طوری که مشاهده می‌شود در بین کلیه ژنتیپ‌های مورد مطالعه، رقم

به ترتیب به میزان ۸/۰۵ و ۷/۷۱ وجود داشت. بیشترین قند ملاس در شرایط بدون تنش و تنش کم‌آبیاری در هیبرید (7112\*SB36)\*S1-56 و هیبرید (7112\*SB36) به ترتیب به میزان ۲/۶۱ و ۳/۱۶ درصد وجود داشت. از لحظه شکر قابل استحصال، رقم شاهد ماندارین به ترتیب در شرایط بدون تنش (۱۹/۸۹ درصد) و تنش کم‌آبیاری (۱۸/۶۳ درصد) دارای بیشترین مقدار بود. رقم شاهد ماندارین در شرایط بدون تنش (۹۰/۴۲ درصد) و تنش کم‌آبیاری (۸۸/۷۶ درصد) دارای بیشترین میزان ضربی استحصال شکر بود (جدول ۵).

نتایج حاصل از مقایسه میانگین ژنتیپ‌ها (جدول ۵) نشان داد که در شرایط تنش کم‌آبیاری نسبت به شرایط بدون تنش برخی از صفات نظیر عملکرد ریشه، عملکرد شکر، ضربی استحصال شکر قابل استحصال، عملکرد شکر سفید و در حالی که صفاتی از قبیل درصد قند، میزان سدیم، پتاسیم، نیتروژن مضره و قند ملاس در شرایط تنش کم‌آبیاری نسبت به شرایط بدون تنش به ترتیب معادل ۹/۹۵، ۵۲/۳۳، ۸/۸۲، ۹/۸۲ و ۴۴/۳۵ و ۲۴/۹۷ درصد افزایش یافتند.

به طور کلی نتایج نشان داد که هیچ‌کدام از هیبریدهای مورد مطالعه از نظر صفات عملکرد ریشه، درصد قند، عملکرد شکر، شکر قابل استحصال و ضربی استحصال شکر نسبت به رقم شاهد ماندارین در شرایط تنش کم‌آبیاری برتری نشان ندادند. در حالی که در بین هیبریدهای مورد مطالعه، هیبرید (7112 \* SB36) در هر دو شرایط آبیاری از نظر اکثر صفات مورد مطالعه نسبت به سایر هیبریدها برتری نشان داد و به عبارتی دارای تحمل به خشکی بالاتری بود. لازم به ذکر است که هیبریدهای ۶ - 66 \* (7112 \* SB36) S1 - 73 و ۷۱۱۲ \* SB36) نیز از نظر صفات عملکرد ریشه و عملکرد شکر در شرایط تنش و بدون تنش دارای مقادیر بیشتر از میانگین کل ژنتیپ‌ها بوده و به عبارتی تحمل به خشکی بالایی نشان دادند (جدول ۵).

میرزایی و رضوانی (Mirzaee and Rezvani, 2007) نیز گزارش کردند که قطع آبیاری در اوخر دوره رشد چغندرقدن، باعث کاهش خصوصیات کیفی شامل عیار قند، عیار قند خالص و راندمان استحصال می‌شود. علاوه بر این تنش رطوبتی در اوخر دوره رشد چغندرقدن باعث افزایش ناخالص‌های ریشه چغندرقدن از جمله پتاسیم و سدیم شده و درنتیجه

در برنامه‌های اصلاح نباتات، انتخاب بر اساس تعداد زیادی صفت زراعی صورت می‌گیرد که ممکن است بین آن‌ها همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشته باشد. لذا روش‌های تجزیه و تحلیل که بدون از بین بردن مقدار زیادی از اطلاعات مفید، تعداد صفات مؤثر بر عملکرد را کاهش دهد، برای پژوهشگر بالارزش هستند. در این خصوص استفاده از همبستگی بین صفات متداول است (Farshadfar, 2000). عروج نیا و همکاران (2012) (Oroojnia et al., 2012) با بررسی اثر تنش خشکی بر روی ژنتیک‌های مختلف چغندرقند نشان دادند که عملکرد شکر سفید همبستگی مثبت و معنی‌داری با صفاتی از قبیل درصد قند، درصد شکر سفید و ضریب استحصال شکر داشت درحالی که بین عملکرد شکر سفید و میزان سدیم همبستگی منفی و معنی‌داری مشاهده شد. AbdollahianNoghabi et al., 2011 (al., 2011) بین صفت عملکرد شکر سفید و صفات عملکرد ریشه و عملکرد شکر همبستگی مثبت و معنی‌داری گزارش نمودند. در تحقیقی مشابه رجبی و همکاران (Rajabi et al., 2013) در بررسی روابط بین صفات در لاینهای چغندرقند بین عملکرد ریشه با صفت عملکرد شکر و عملکرد شکر سفید همبستگی مثبت و معنی‌دار و با صفات میزان ازت مضره و پتاسیم ریشه همبستگی منفی و معنی‌داری گزارش نمودند. ایشان همچنین بین صفات عملکرد شکر سفید با درصد استحصال همبستگی مثبت و با صفات میزان ازت مضره و پتاسیم و قند ملاس همبستگی منفی و معنی‌دار گزارش نمودند.

نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون گام‌به‌گام برای عملکرد شکر سفید به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیرهای مستقل در شرایط بدون تنش در جدول ۸ نشان داده شده است. بر اساس آن، صفات عملکرد شکر، ضریب استحصال شکر، درصد قند ملاس، عملکرد ریشه و درصد قند وارد مدل شده‌اند و در مدل باقی‌مانده و تغییرات عملکرد شکر سفید را تعیین نمودند و به عبارتی بهبود این صفات اثرات مشتی بر عملکرد شکر سفید دارد. همچنین با توجه به جدول ۸ می‌توان وجود یک رابطه قوی بین عملکرد شکر سفید با صفات مذکور را مشاهده نمود که با همبستگی بالای میان آن‌ها و عملکرد شکر سفید نسبت دارد.

شاهد ماندارین در شرایط تنش در رتبه اول و در شرایط بدون تنش در جایگاه دوم قرار گرفت و دارای بالاترین مقدار STI (1/۳۶) بود و به عنوان متحمل ترین ژنوتیپ شناخته شد. لازم به ذکر است که در بین هیبریدهای تست کراس مورد مطالعه، هیبرید تست کراس S1-73 (7112\*SB36) دارای بالاترین میزان شاخص STI (۰/۹۵) بود و به عبارتی به عنوان هیبرید تست کراس متحمل به خشکی شناسایی شد. پس از هیبرید مذکور، هیبریدهای 66 (7112\*SB36) S1-66 (7112\*SB36) و ۰/۸۹ (7112\*SB36) S1-72 (7112\*SB36) به ترتیب دارای مقدار STI معادل ۰/۸۸ و ۰/۸۰ بودند و در جایگاه‌های بعدی از نظر تحمل به خشکی قرار گرفتند (جدول ۶). محمدیان و همکاران (Mohammadian et al., 2003)، وزان (Vazan, 2002) فضلی و همکاران (Fazli et al., 1998) نیز شاخص STI را به عنوان بهترین شاخص ارزیابی کننده تحمل به خشکی در مواد ژنتیکی چغندرقند معرفی کردند.

ضرایب همبستگی صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقند تحت شرایط بدون تنش و تست کم‌آبیاری در جدول ۷ نشان داده شده است. مقایسه ضرایب همبستگی در شرایط بدون تنش نشان داد که بین عملکرد شکر سفید و صفاتی از قبیل عملکرد ریشه ( $F=0/93^{***}$ )، درصد قند ( $F=0/95^{***}$ )، عملکرد شکر ( $F=0/95^{***}$ )، شکر قابل استحصال ( $F=0/52^{***}$ ) و ضریب استحصال شکر ( $F=0/60^{***}$ ) همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. علاوه بر این بین عملکرد شکر سفید و صفات میزان سدیم ( $F=0/32^{***}$ ، پتاسیم ( $F=0/44^{***}$ )، ضریب قلیائیت ( $F=0/45^{***}$ ) و درصد قند ملاس ( $F=0/41^{***}$ ) همبستگی منفی و معنی‌داری در سطح یک درصد مشاهده شد. لازم به ذکر است که در این شرایط بیشترین همبستگی ( $F=0/98^{***}$ ) بین درصد قند و شکر قابل استحصال وجود داشت (جدول ۷). در شرایط تنش کم‌آبیاری، بین عملکرد شکر سفید و صفات عملکرد ریشه ( $F=0/93^{***}$ )، درصد قند ( $F=0/65^{***}$ ، عملکرد شکر ( $F=0/99^{***}$ ، شکر قابل استحصال ( $F=0/67^{***}$ ) و ضریب استحصال شکر ( $F=0/47^{***}$ ) همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. درحالی‌که بین عملکرد شکر سفید و میزان سدیم ( $F=0/53^{***}$ ، پتاسیم ( $F=0/53^{***}$ ، ضریب قلیائیت ( $F=0/41^{***}$  و درصد قند ملاس ( $F=0/57^{***}$ ) همبستگی منفی و معنی‌داری در سطح یک درصد مشاهده شد (جدول ۷).

جدول ۵. مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف چغندر قند تحت شرایط بدون تنفس (نرمال) و تنفس کم آبیاری  
Table 5. Mean comparison of yield and yield components of different sugar beet genotypes under normal and water deficit stress conditions

ژنوتیپ Genotype	عملکرد ریشه		درصد قند		عملکرد شکر		سدیم		پتاسیم	
	Root yield (t.ha <sup>-1</sup> )		Sugar content (%)		Sugar yield (t.ha <sup>-1</sup> )		Na (Meq/100 g)	نرمال	تنفس	نرمال
	نرمال Normal	تنفس Stress	نرمال Normal	تنفس Stress	نرمال Normal	تنفس Stress	نرمال Normal	تنفس Stress	نرمال Normal	تنفس Stress
(7112*SB36)*S1-28	64.51	35.07	18.80	21.30	12.15	7.47	1.53	1.60	4.15	4.46
(7112*SB36)*S1-55	51.87	28.08	18.99	22.41	9.86	6.32	1.50	2.40	4.50	5.83
(7112*SB36)*S1-49	50.00	32.79	18.50	19.35	9.25	6.34	1.63	2.26	4.80	4.73
(7112*SB36)*S1-12	51.38	39.39	18.74	20.53	9.62	8.11	1.36	2.13	4.57	5.60
(7112*SB36)*S1-48	51.84	28.18	18.28	19.41	9.47	5.47	1.48	2.30	4.83	5.51
(7112*SB36)*S1-45	40.18	35.20	17.80	20.44	7.15	7.20	1.67	1.89	5.24	5.68
(7112*SB36)*S1-44	59.13	36.10	18.70	21.45	11.07	7.75	1.63	1.93	4.72	4.76
(7112*SB36)*S1-39	50.53	30.16	18.61	21.14	9.35	6.38	1.51	1.77	4.66	4.50
(7112*SB36)*S1-21	47.19	32.07	19.44	21.04	9.19	6.77	1.38	1.99	4.66	4.94
(7112*SB36)*S1-42	56.74	36.48	18.88	20.71	10.68	7.55	1.70	2.12	4.55	5.21
(7112*SB36)*S1-77	50.86	29.54	18.95	19.21	9.65	5.67	1.36	2.72	4.87	5.50
(7112*SB36)*S1-86	53.39	34.27	19.00	19.51	10.15	6.68	1.70	2.80	4.75	5.10
(7112*SB36)*S1-40	50.52	31.71	18.25	20.28	9.22	6.44	1.56	2.50	4.64	5.08
(7112*SB36)*S1-38	47.34	31.28	17.78	20.04	8.42	6.26	1.55	2.62	4.82	5.02
(7112*SB36)*S1-18	56.74	43.12	18.33	21.53	10.41	9.31	1.47	1.97	4.76	4.83
(7112*SB36)*S1-20	51.32	38.18	18.88	20.38	9.66	7.77	1.42	2.41	4.65	5.19
(7112*SB36)*S1-26	46.16	33.71	18.09	19.74	8.35	6.67	1.84	3.10	5.16	5.15
(7112*SB36)*S1-36	67.41	32.43	18.95	21.23	12.81	6.88	1.45	1.72	4.65	4.82
(7112*SB36)*S1-46	47.96	27.36	18.41	19.78	8.83	5.41	1.56	2.38	4.64	5.44
(7112*SB36)*S1-69	47.93	30.62	18.13	19.00	8.68	5.82	1.78	3.26	5.80	6.22
(7112*SB36)*S1-57	44.50	30.53	18.98	21.38	8.49	6.53	1.62	3.19	4.76	5.77
(7112*SB36)*S1-17	49.69	33.52	19.30	19.74	9.64	6.62	1.23	2.85	4.65	5.42
(7112*SB36)*S1-31	51.50	33.54	18.95	20.73	9.78	6.95	1.42	2.11	4.67	4.83
(7112*SB36)*S1-2	49.09	28.68	19.10	19.70	9.33	5.65	1.44	2.52	4.48	5.14
(7112*SB36)*S1-5	49.93	35.34	18.40	20.43	9.17	7.24	2.10	2.37	4.48	5.16
(7112*SB36)*S1-6	46.64	32.26	18.89	20.51	8.80	6.62	1.40	2.25	4.59	5.06
(7112*SB36)*S1-94	50.26	31.62	18.55	19.53	9.36	6.17	1.54	2.61	4.79	5.57
(7112*SB36)*S1-93	51.71	32.56	18.45	20.88	9.53	6.80	1.63	1.94	4.90	5.56
(7112*SB36)*S1-56	57.00	26.22	17.45	20.13	9.94	5.27	2.45	2.41	5.62	5.58
(7112*SB36)*S1-8	63.30	41.07	18.88	19.95	11.92	8.19	1.47	2.61	4.54	5.09
(7112*SB36)*S1-22	52.98	33.21	19.04	20.30	10.06	6.74	1.55	2.66	5.04	5.48
(7112*SB36)*S1-7	47.00	36.55	18.59	22.03	8.73	8.04	1.54	1.23	4.39	4.35
(7112*SB36)*S1-89	51.93	27.35	18.89	20.89	9.82	5.72	1.50	2.28	5.12	4.82
(7112*SB36)*S1-19	58.50	29.72	18.55	20.49	10.80	6.09	1.75	1.75	4.71	4.94
(7112*SB36)*S1-37	51.10	31.30	18.46	20.04	9.44	6.29	1.68	2.46	5.02	5.41
(7112*SB36)*S1-32	51.46	32.02	17.76	18.84	9.15	6.04	1.89	3.52	5.19	5.66
(7112*SB36)*S1-54	51.46	31.67	18.94	19.98	9.77	6.33	1.55	2.63	4.42	5.37

**Table 5. Continued**

جدول ۵. ادامه

ژنوتیپ Genotype	عملکرد ریشه Root yield (t.ha <sup>-1</sup> )		درصد قند Sugar content (%)		عملکرد شکر Sugar yield (t.ha <sup>-1</sup> )		سدیم Na(Meq/100 g)		پتاسیم K (Meq/100 g)	
	نرمال Normal		تنش Stress		نرمال Normal		تنش Stress		نرمال Normal	
(7112*SB36)*S1-53	48.24	34.07	19.40	20.61	9.33	7.03	1.19	2.17	4.45	5.11
(7112*SB36)*S1-92	55.37	32.17	18.51	19.44	10.27	6.24	1.60	2.80	4.95	5.07
(7112*SB36)*S1-66	63.95	45.75	17.84	20.53	11.39	9.38	1.41	2.36	4.28	4.80
(7112*SB36)*S1-10	58.23	30.06	19.09	19.85	11.12	5.98	1.25	2.53	4.56	5.17
(7112*SB36)*S1-76	46.94	35.19	19.55	20.35	9.21	7.17	1.22	1.65	4.15	5.08
(7112*SB36)*S1-100	54.80	38.12	18.15	19.98	9.91	7.62	1.75	2.74	4.96	5.09
(7112*SB36)*S1-13	60.96	36.78	18.71	20.71	11.39	7.63	1.65	1.70	4.68	5.18
(7112*SB36)*S1-63	46.07	30.12	18.86	20.75	8.69	6.25	1.75	2.64	4.66	4.32
(7112*SB36)*S1-90	43.82	27.50	19.40	20.48	8.52	5.63	1.36	2.64	4.84	5.10
(7112*SB36)*S1-84	54.62	30.96	18.04	19.81	9.86	6.14	1.73	2.77	5.17	5.55
(7112*SB36)*S1-61	52.42	29.93	18.55	21.41	9.70	6.41	1.65	1.43	4.49	4.99
(7112*SB36)*S1-15	53.85	40.44	18.76	20.74	10.12	8.38	1.47	2.97	4.53	5.49
(7112*SB36)*S1-4	57.32	28.96	19.21	20.45	11.02	5.92	2.21	2.91	5.12	5.70
(7112*SB36)*S1-73	72.07	39.80	19.74	20.10	14.20	8.00	1.14	2.21	4.13	5.13
(7112*SB36)*S1-16	56.35	44.27	18.70	19.55	10.53	8.66	1.78	3.54	4.95	5.53
(7112*SB36)*S1-71	57.55	39.60	18.79	20.94	10.82	8.29	1.34	1.73	4.55	5.04
(7112*SB36)*S1-70	56.35	39.60	18.06	19.91	10.21	7.88	1.43	2.57	5.05	5.79
(7112*SB36)*S1-3	56.29	41.07	19.13	20.18	10.77	8.28	1.22	1.67	4.48	5.19
(7112*SB36)*S1-72	64.93	45.38	18.53	19.90	12.03	9.04	1.91	2.10	5.06	5.15
(7112*SB36)*S1-88	53.13	30.80	18.65	20.20	9.86	6.22	1.46	2.64	4.92	5.84
SC(7112*SB36)	50.38	37.79	19.48	20.74	9.83	7.83	1.23	2.47	3.86	4.53
Paya	59.93	41.38	17.68	19.70	10.57	8.15	1.83	1.99	5.01	5.35
IR7	56.92	46.86	20.85	22.89	11.86	10.72	1.21	1.57	4.57	4.87
Mandarin	61.28	50.33	20.98	22.98	12.85	11.55	1.10	1.62	3.82	3.96
Parental population	46.22	30.56	18.70	20.35	8.65	6.22	1.18	2.78	4.20	5.37
Fotora	58.67	42.36	20.75	22.94	12.15	9.71	1.08	1.45	4.19	4.31
Jolgeh	42.55	29.14	18.28	19.04	7.78	5.55	1.90	3.69	5.00	5.57
Mean میانگین	53.29	34.56	18.77	20.44	10.01	7.08	1.54	2.35	4.71	5.17
LSD 0.05	6.496	5.426	1.063	0.724	1.295	1.173	0.583	0.349	0.683	0.394
LSD 0.01	8.569	7.158	1.402	0.955	1.708	1.547	0.769	0.461	0.900	0.520

Table 5. Continued

جدول ۵. ادامه

ژنتیپ Genotype	قند ملاس												ضریب استحصال شکر Extraction coefficient of sugar (%)	
	نیتروژن مضره N(Meq/100 g)		ضریب قلیائیت Alkalinity		Molasses sugar (%)		شکر قابل استحصال White sugar content (%)							
	نرمال Normal	تنش Stress	نرمال Normal	تنش Stress	نرمال Normal	تنش Stress	نرمال Normal	تنش Stress	نرمال Normal	تنش Stress	نرمال Normal	تنش Stress		
(7112*SB36)*S1-28	1.23	1.38	4.69	4.40	1.75	1.90	17.45	16.81	88.04	87.04				
(7112*SB36)*S1-55	1.28	1.84	4.76	4.92	1.87	2.69	17.52	17.13	87.61	83.09				
(7112*SB36)*S1-49	1.11	1.28	6.26	5.78	2.00	2.21	16.90	14.55	86.64	84.09				
(7112*SB36)*S1-12	1.20	1.65	5.16	4.82	1.83	2.50	17.31	15.43	87.63	83.29				
(7112*SB36)*S1-48	0.95	1.25	6.83	6.28	1.95	2.49	16.73	14.33	86.76	82.23				
(7112*SB36)*S1-45	1.12	1.63	6.19	4.67	2.17	2.44	16.03	15.40	84.99	83.49				
(7112*SB36)*S1-44	1.38	1.50	4.66	4.60	2.00	2.12	17.10	16.68	86.65	85.94				
(7112*SB36)*S1-39	1.26	1.24	5.17	5.28	1.93	1.96	17.09	16.58	86.96	86.64				
(7112*SB36)*S1-21	1.16	1.55	5.46	4.66	1.87	2.21	17.97	16.23	87.78	84.96				
(7112*SB36)*S1-42	1.57	1.79	4.38	4.30	1.98	2.37	17.30	15.72	86.67	84.01				
(7112*SB36)*S1-77	1.03	1.59	6.20	5.57	1.92	2.66	17.43	14.46	87.26	80.75				
(7112*SB36)*S1-86	1.29	2.70	5.10	3.16	2.02	2.65	17.38	14.26	86.89	81.26				
(7112*SB36)*S1-40	1.03	1.81	6.25	4.55	1.91	2.46	16.74	15.21	86.81	83.04				
(7112*SB36)*S1-38	0.98	1.52	6.57	5.11	1.97	2.45	16.21	14.99	86.23	82.53				
(7112*SB36)*S1-18	1.29	1.36	5.43	5.07	1.95	2.15	16.78	16.78	86.66	85.85				
(7112*SB36)*S1-20	1.47	2.36	4.19	3.58	1.91	2.52	17.37	15.26	87.36	82.79				
(7112*SB36)*S1-26	1.19	2.06	6.61	4.22	2.20	2.72	16.29	14.42	85.31	81.03				
(7112*SB36)*S1-36	1.23	1.43	5.11	4.67	1.90	2.07	17.46	16.56	87.46	86.09				
(7112*SB36)*S1-46	1.16	1.59	5.77	5.18	1.93	2.52	16.89	14.65	86.95	82.23				
(7112*SB36)*S1-69	1.09	2.34	6.96	4.15	2.39	3.16	16.14	13.24	84.25	77.67				
(7112*SB36)*S1-57	1.54	1.86	4.31	5.17	2.02	2.94	17.35	15.84	86.87	81.57				
(7112*SB36)*S1-17	1.01	1.85	5.83	4.64	1.80	2.70	17.90	14.44	88.10	81.19				
(7112*SB36)*S1-31	1.23	1.37	5.44	5.26	1.89	2.20	17.46	15.93	87.44	84.88				
(7112*SB36)*S1-2	1.03	1.74	5.75	5.15	1.81	2.48	17.69	14.62	87.94	82.09				
(7112*SB36)*S1-5	1.37	1.79	4.83	4.58	2.07	2.44	16.73	15.41	86.18	83.33				
(7112*SB36)*S1-6	1.13	1.51	5.84	4.92	1.85	2.34	17.44	15.57	87.66	84.03				
(7112*SB36)*S1-94	1.33	2.66	5.33	3.31	1.99	2.74	16.97	14.18	86.64	80.95				
(7112*SB36)*S1-93	1.38	1.64	5.00	4.65	2.06	2.42	16.79	15.86	86.16	83.98				
(7112*SB36)*S1-56	1.60	1.87	5.15	4.53	2.61	2.60	15.24	14.92	82.49	82.05				
(7112*SB36)*S1-8	1.28	1.86	4.68	4.55	1.87	2.50	17.41	14.85	87.50	82.42				
(7112*SB36)*S1-22	1.17	2.24	5.72	3.63	2.06	2.69	17.38	15.01	86.61	81.86				
(7112*SB36)*S1-7	1.27	1.23	5.39	4.59	1.83	1.72	17.16	17.71	87.32	88.37				
(7112*SB36)*S1-89	1.12	1.71	6.29	4.34	2.07	2.29	17.22	16.00	86.42	84.67				
(7112*SB36)*S1-19	1.52	1.54	4.46	4.89	2.05	2.13	16.91	15.76	86.31	84.97				
(7112*SB36)*S1-37	1.07	1.73	6.78	4.92	2.09	2.55	16.78	14.89	86.07	82.32				
(7112*SB36)*S1-32	1.45	1.75	4.94	5.39	2.25	3.00	15.91	13.24	84.50	78.56				
(7112*SB36)*S1-54	1.30	2.10	4.62	4.08	1.86	2.66	17.48	14.72	87.65	81.85				

Table 5. Continued

جدول ۵. ادامه

ژنوتیپ Genotype	ضریب استحصال شکر											
	نیتروژن مضره N(Meq/100 g)		ضریب قلیاچیت Alkalinity		قند ملاس Molasses sugar (%)		استحصال White sugar content (%)		ضریب استحصال شکر قابل		ضریب استحصال شکر	
	نرمال Normal	تنش Stress	نرمال Normal	تنش Stress	نرمال Normal	تنش Stress	نرمال Normal	تنش Stress	نرمال Normal	تنش Stress	نرمال Normal	تنش Stress
(7112*SB36)*S1-53	0.94	2.04	6.03	3.74	1.71	2.38	18.09	15.64	88.59	83.75		
(7112*SB36)*S1-92	1.15	1.73	5.99	5.34	2.04	2.55	16.87	14.29	86.39	81.72		
(7112*SB36)*S1-66	1.09	1.79	5.53	4.32	1.75	2.31	16.49	15.61	87.59	84.27		
(7112*SB36)*S1-10	1.11	2.00	5.53	4.08	1.79	2.54	17.70	14.70	88.12	82.12		
(7112*SB36)*S1-76	1.01	1.57	5.42	4.64	1.63	2.15	18.33	15.61	89.14	85.39		
(7112*SB36)*S1-100	1.40	2.25	5.23	3.75	2.12	2.58	16.43	14.80	85.67	82.08		
(7112*SB36)*S1-13	1.32	1.39	5.23	5.03	1.98	2.18	17.13	15.94	86.77	85.13		
(7112*SB36)*S1-63	1.44	1.63	4.84	4.42	2.03	2.15	17.24	16.01	86.76	85.11		
(7112*SB36)*S1-90	0.94	1.68	6.67	4.98	1.90	2.51	17.90	15.38	87.66	82.50		
(7112*SB36)*S1-84	1.12	1.58	6.37	5.53	2.16	2.69	16.28	14.52	85.40	81.29		
(7112*SB36)*S1-61	1.16	1.32	5.52	5.07	1.91	2.01	17.05	17.02	87.18	88.15		
(7112*SB36)*S1-15	1.21	2.08	5.08	4.25	1.86	2.79	17.30	15.35	87.36	81.93		
(7112*SB36)*S1-4	1.26	1.80	5.81	5.15	2.32	2.82	17.29	15.04	85.40	81.34		
(7112*SB36)*S1-73	1.02	1.91	5.32	3.94	1.59	2.39	18.55	15.12	89.43	83.37		
(7112*SB36)*S1-16	1.60	2.45	4.49	3.97	2.15	3.03	16.95	13.92	86.01	78.51		
(7112*SB36)*S1-71	1.06	1.39	5.62	5.17	1.81	2.14	17.38	16.20	87.78	85.46		
(7112*SB36)*S1-70	1.20	2.26	5.72	4.18	2.02	2.77	16.44	14.55	86.02	81.06		
(7112*SB36)*S1-3	1.24	1.46	4.85	4.92	1.76	2.18	17.76	15.40	88.24	84.57		
(7112*SB36)*S1-72	1.22	1.36	5.85	5.29	2.19	2.31	16.73	15.00	85.61	83.06		
(7112*SB36)*S1-88	1.10	2.01	5.96	5.00	1.98	2.79	17.07	15.14	86.76	83.60		
SC (7112*SB36)	1.18	2.23	4.39	3.42	1.55	2.30	18.33	15.84	89.46	84.18		
Paya	1.42	1.74	4.93	4.26	2.17	2.37	15.91	14.73	85.12	83.38		
IR7	1.23	1.79	4.92	4.05	1.79	2.07	19.46	18.22	88.94	87.17		
Mandarin	1.22	1.60	4.04	3.54	1.49	1.75	19.89	18.63	90.42	88.76		
Parental population	1.18	1.58	4.60	5.33	1.65	2.63	17.46	15.12	88.56	82.36		
Fotora	1.20	1.86	4.49	3.15	1.61	1.83	19.54	18.51	89.74	88.37		
Jolgeh	0.86	1.27	8.05	7.71	2.14	2.99	16.54	13.45	85.63	78.22		
Mean میانگین	1.21	1.75	5.44	4.65	1.95	2.43	17.22	15.43	86.98	83.34		
LSD 0.05	0.436	0.410	1.206	0.435	0.431	0.469	0.989	0.394	1.356	0.583		
LSD 0.01	0.575	0.541	1.353	0.574	0.568	0.618	1.305	0.520	1.789	0.769		

جدول ۶. میانگین عملکرد شکر سفید (تن در هکتار) ژنوتیپ‌های چغندرقند تحت شرایط بدون تنفس و تنفس کمآبیاری

Table 6. Mean white sugar yield ( $t.ha^{-1}$ ) of sugar beet genotypes under normal and water deficit stress conditions

نام ژنوتیپ Genotype name	بدون تنفس (Normal)	رتبه ژنوتیپ Genotype rank	تنفس (Stress)	رتبه ژنوتیپ Genotype rank	شاخص تحمل به تنفس (STI)
Mandarin	12.19	2	9.37	1	1.36
IR7	11.08	6	8.53	2	1.12
Fotora	11.46	4	7.84	3	1.07
(7112 * SB36) * S1-73	13.34	1	6.01	16	0.95
(7112 * SB36) * S1-66	10.53	9	7.14	5	0.89
(7112 * SB36) * S1-72	10.87	8	6.80	6	0.88
(7112 * SB36) * S1-18	9.53	19	7.25	4	0.82
(7112 * SB36) * S1-8	10.97	7	6.10	12	0.79
(7112 * SB36) * S1-28	11.28	5	5.89	18	0.79
(7112 * SB36) * S1-71	10.01	14	6.41	8	0.76
(7112 * SB36) * S1-36	11.81	3	5.37	27	0.75
(7112 * SB36) * S1-3	10.01	13	6.33	9	0.75
(7112 * SB36) * S1-13	10.45	10	5.87	19	0.73
(7112 * SB36) * S1-44	10.10	12	6.01	15	0.72
(7112 * SB36) * S1-16	9.55	18	6.16	11	0.70
Paya	9.52	20	6.08	13	0.69
(7112 * SB36) * S1-15	9.31	22	6.21	10	0.69
(7112 * SB36) * S1-42	9.77	17	5.73	22	0.67
SC (7112*SB36)	9.24	25	5.99	17	0.66
(7112 * SB36) * S1-12	8.88	37	6.08	14	0.64
(7112 * SB36) * S1-70	9.29	23	5.75	21	0.63
(7112 * SB36) * S1-7	8.07	56	6.47	7	0.62
(7112 * SB36) * S1-20	8.88	38	5.82	20	0.61
(7112 * SB36) * S1-100	9.00	30	5.64	23	0.60
(7112 * SB36) * S1-31	8.99	31	5.34	28	0.57
(7112 * SB36) * S1-76	8.64	43	5.49	24	0.56
(7112 * SB36) * S1-53	8.70	39	5.32	29	0.55
(7112 * SB36) * S1-19	9.89	16	4.68	45	0.55
(7112 * SB36) * S1-22	9.19	26	4.99	35	0.54
(7112 * SB36) * S1-10	10.32	11	4.41	53	0.54
(7112 * SB36) * S1-61	8.91	34	5.10	32	0.54
(7112 * SB36) * S1-86	9.28	24	4.89	36	0.54
(7112 * SB36) * S1-93	8.67	42	5.17	31	0.53
(7112 * SB36) * S1-21	8.49	48	5.21	30	0.52
(7112 * SB36) * S1-55	9.11	27	4.81	42	0.52
(7112 * SB36) * S1-17	8.92	33	4.85	38	0.51
(7112 * SB36) * S1-4	9.92	15	4.35	55	0.51
(7112 * SB36) * S1-92	9.37	21	4.60	50	0.51
(7112 * SB36) * S1-39	8.60	45	5.01	34	0.51
(7112 * SB36) * S1-88	9.06	28	4.66	48	0.50
(7112 * SB36) * S1-54	9.02	29	4.67	46	0.50
(7112 * SB36) * S1-6	8.11	53	5.02	33	0.48
(7112 * SB36) * S1-40	8.45	49	4.82	40	0.48
(7112 * SB36) * S1-49	8.45	50	4.77	43	0.48
(7112 * SB36) * S1-84	8.90	35	4.51	51	0.48
(7112 * SB36) * S1-37	8.57	46	4.66	47	0.47
(7112 * SB36) * S1-89	8.93	32	4.38	54	0.46
(7112 * SB36) * S1-94	8.56	47	4.49	52	0.46
(7112 * SB36) * S1-63	7.95	57	4.82	41	0.45
(7112 * SB36) * S1-77	8.89	36	4.27	56	0.45

Table 6. Continued

جدول ۶. ادامه

نام ژنوتیپ Genotype name	بدون تنش (Non-Stress)	رنج ژنوتیپ Genotype rank	تنش (Stress)	رتبه ژنوتیپ Genotype rank	شاخص تحمل به تنش (STI)
(7112 * SB36) * S1-57	7.76	59	4.84	39	0.45
Parental population	8.07	55	4.62	49	0.44
(7112 * SB36) * S1-26	7.52	62	4.87	37	0.43
(7112 * SB36) * S1-2	8.63	44	4.19	59	0.43
(7112 * SB36) * S1-38	7.66	61	4.69	44	0.43
(7112 * SB36) * S1-45	6.46	64	5.42	26	0.42
(7112 * SB36) * S1-48	8.67	41	4.04	61	0.42
(7112 * SB36) * S1-32	8.20	52	4.25	57	0.41
(7112 * SB36) * S1-56	8.68	40	3.91	64	0.40
(7112 * SB36) * S1-5	8.33	51	5.48	25	0.40
(7112 * SB36) * S1-90	7.86	58	4.23	58	0.39
(7112 * SB36) * S1-46	8.09	54	4.01	62	0.38
(7112 * SB36) * S1-69	7.73	60	4.06	60	0.37
Jolgeh	7.01	63	3.93	63	0.33

جدول ۷. ضرایب همبستگی صفات موردمطالعه در ژنوتیپ‌های مختلف چندرقند تحت شرایط بدون تنش (بالای قطر اصلی ماتریس) و تنش کم‌آبیاری (پایین قطر اصلی ماتریس)

Table 7. Correlation coefficients of studied traits in different sugar beet genotypes under normal (top of the main diagonal of the matrix) and water deficit stress (bottom of the main diagonal of the matrix)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1      عملکرد ریشه Root yield	-	0.17 <sup>ns</sup>	0.95**	-0.06 <sup>ns</sup>	-0.21 <sup>ns</sup>	0.22 <sup>ns</sup>	-0.37**	-0.14 <sup>ns</sup>	0.17 <sup>ns</sup>	0.93**	0.16 <sup>ns</sup>
2      درصد قند Sugar content	0.35**	-	0.45**	-0.64**	-0.61**	-0.14 <sup>ns</sup>	-0.35**	-0.67**	0.98**	0.51**	0.81**
3      عملکرد شکر Sugar yield	0.97**	0.56**	-	-0.24*	-0.37**	0.15 <sup>ns</sup>	-0.44**	-0.32**	0.45**	0.95**	0.38**
4      سدیم Na	-0.30*	-0.66**	-0.43**	-	0.68**	0.45**	0.16 <sup>ns</sup>	0.90**	-0.74**	-0.32**	-0.88**
5      پتاسیم K	-0.34**	-0.55**	-0.44**	0.58**	-	0.12 <sup>ns</sup>	0.51**	0.93**	-0.73**	-0.44**	-0.90**
6      نیتروژن مضره N	0.09 <sup>ns</sup>	-0.25*	0.01 <sup>ns</sup>	0.49**	0.35**	-	-0.73**	0.35**	-0.20 <sup>ns</sup>	0.11 <sup>ns</sup>	-0.32**
7      ضریب قلیائیت Alkalinity	-0.41**	-0.29*	-0.43**	0.16 <sup>ns</sup>	0.23 <sup>ns</sup>	-0.71**	-	0.33**	-0.37**	-0.45**	-0.35**
8      درصد قند ملاس Molasses sugar	-0.33**	-0.67**	-0.46**	0.91**	0.86**	0.56**	0.14 <sup>ns</sup>	-	-0.80**	-0.41**	-0.97**
9      شکر قابل استحصال White sugar content	0.36**	0.98**	0.57**	-0.77**	-0.66**	-0.36**	-0.25*	-0.81**	-	0.52**	0.90**
10     عملکرد شکر سفید White sugar yield	0.93**	0.65**	0.99**	-0.53**	-0.53**	-0.06 <sup>ns</sup>	-0.41**	-0.57**	0.67**	-	0.47**
11     ضریب استحصال شکر Extraction coefficient of sugar	0.32**	0.81**	0.49**	-0.91**	-0.77**	-0.50**	-0.19 <sup>ns</sup>	-0.95**	0.91**	0.60**	-

\* و \*\* به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد ns, \*and\*\*: None significant and significant at 5 and 1%, Respectively.

می‌توان از آن به عنوان یکی از شاخص‌های انتخاب استفاده نمود (جدول ۱۱). همبستگی معنی‌دار و مثبت عملکرد شکر سفید در شرایط تنش با عملکرد شکر نشان‌دهنده تأثیر بیشتر این صفت در میزان عملکرد شکر سفید است.

عبدالهیان نوqابی و همکاران (Abdollahian Noghabi et al., 2011) گزارش کردند که چهار صفت عملکرد ریشه، درصد قند، عملکرد شکر و شکر قابل استحصال به طور معنی‌داری تغییرات عملکرد شکر سفید را توجیه می‌کند. غفاری و همکاران (Ghafari et al., 2016) نشان دادند که بر اساس نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون گام‌به‌گام صفات عملکرد ریشه، درصد قند، میزان سدیم و میزان پتاسیم بیش از ۹۶ درصد تغییرات عملکرد شکر سفید را در شرایط تنش خشکی توجیه کردند. نصری و همکاران (Nasri et al., 2012) نیز گزارش نمودند که عملکرد ریشه به تنهایی ۹۱ درصد از تغییرات عملکرد شکر سفید را تحت شرایط تنش شوری در ژنوتیپ‌های مورد بررسی توجیه کرد. اودا سوهیر (Ouda Sohier, 2005) نیز گزارش کرد که عملکرد شکر سفید می‌باشد. قند دارای بیشترین اثر بر روی عملکرد شکر سفید می‌باشد. در پژوهش حاضر، با توجه به متغیرهای ورودی به مدل چنین بر می‌آید که انتخاب برای عملکرد شکر، ضریب استحصال شکر، عملکرد ریشه و درصد قند به افزایش عملکرد شکر سفید منجر شود. به طور کلی بررسی همبستگی بین صفات، رگرسیون گام‌به‌گام و تجزیه علیت نشان داد که عملکرد شکر، ضریب استحصال شکر، عملکرد ریشه و درصد قند مناسب‌ترین شاخص‌های انتخاب برای بهبود ژنتیکی عملکرد شکر سفید ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقند در هر دو شرایط بدون تنش و تنش کم‌آبیاری می‌باشدند که این امر می‌تواند باعث تسریع در امر انتخاب ژنوتیپ‌ها برتر گردد؛ به عبارت دیگر ارزیابی ژنوتیپ‌ها بر اساس عملکرد شکر می‌تواند خیلی راحت‌تر از انتخاب آن‌ها بر اساس عملکرد شکر خالص باشد. علاوه بر این از مقایسه روابط بین صفات در دو محیط تنش و بدون تنش کم‌آبیاری می‌توان دریافت که شرایط محیطی تأثیر زیادی بر این روابط داشته و لذا تعیین شاخص‌های انتخاب مؤثر در بهبود عملکرد شکر سفید برای هر محیط بایستی با توجه به شرایط آن صورت گیرد.

نتایج رگرسیون گام‌به‌گام در شرایط تنش کم‌آبیاری در جدول ۹ آورده شده است. در این شرایط پنج صفت عملکرد شکر، ضریب استحصال شکر، عملکرد ریشه، درصد قند و شکر قابل استحصال وارد مدل شده که بیش از ۹۹ درصد از تغییرات عملکرد شکر سفید را توجیه نمودند که چنین رابطه قوی بین عملکرد شکر سفید و صفات مذکور را می‌توان به رابطه مستقیم این صفات نسبت داد. سایر صفات موردمطالعه تأثیر معنی‌داری بر مدل نداشتند و اختلاف ژنوتیپ‌ها از نظر صفت عملکرد شکر سفید را می‌توان به تفاوت در صفات فوق نسبت داد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، صفات عملکرد شکر، ضریب استحصال شکر، عملکرد ریشه و درصد قند در هر دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی وارد مدل شدند، درنتیجه به عنوان مهم‌ترین صفات مؤثر بر عملکرد شکر سفید چغندرقند در شرایط بدون تنش و تنش در نظر گرفته می‌شوند و احتمالاً گزینش بهمنظور افزایش عملکرد شکر سفید از طریق صفات عملکرد شکر، ضریب استحصال شکر، عملکرد ریشه و درصد قند مؤثر خواهد بود. بررسی ضرایب تبیین ( $R^2$ ) نشان داد که بیش از ۹۹ درصد از تغییرات موجود در عملکرد شکر سفید در شرایط بدون تنش و تنش کم‌آبیاری توسط متغیرهای مستقل قابل توجیه بود (جدول ۸ و ۹).

نتایج تجزیه علیت نشان داد که اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بر عملکرد شکر سفید تحت شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی متفاوت است (جدول ۱۰ و ۱۱). در شرایط عدم تنش، عملکرد ریشه (۱/۱۷) بیشترین اثر مستقیم را روی عملکرد شکر سفید داشت. هماهنگی علامت و معنی‌دار بودن اثر مستقیم این صفت با همبستگی ساده آن با عملکرد شکر سفید بیانگر این مطلب است که این صفت می‌تواند جهت گزینش ارقام پر محصول مؤثر باشدند. در شرایط عدم تنش عملکرد شکر که اولین صفت وارد شده در مدل است با تأثیر غیرمستقیم عملکرد ریشه بیشترین اثر را روی عملکرد شکر سفید داشت (جدول ۱۰)، بنابراین در شرایط عدم تنش، عملکرد ریشه بیشترین اثر را در افزایش عملکرد شکر سفید دارد.

در شرایط تنش کم‌آبیاری، عملکرد شکر بالاترین اثر مستقیم را بر عملکرد شکر سفید داشت، لذا به دلیل اثرات مستقیم و مشبت زیادی که این صفت بر عملکرد شکر سفید دارد

جدول ۸. ضرایب رگرسیون صفات مؤثر بر عملکرد شکر سفید در شرایط بدون تنفس بر اساس مدل رگرسیونی گام به گام

Table 8. Regression coefficients of traits affecting white sugar yield under normal conditions based on stepwise regression model

Traits	صفات	ضریب رگرسیون Regression coefficient	ضریب تبیین مدل Model R-Square	ضریب تبیین جزء Partial R-Square
Sugar yield	عملکرد شکر	1.130**	0.9903	0.9903
Extraction coefficient of sugar	ضریب استحصال شکر	-0.013ns	0.9996	0.0093
Molasses sugar	درصد قند ملاس	-0.606**	0.9996	0.0001
Root yield	عملکرد ریشه	-0.039**	0.9998	0.0001
Sugar content	درصد قند	-0.063ns	0.9998	0.0000
Intercept	عرض از مبدأ	3.449ns		

ns, \*and\*\*: None significant and significant at 5 and 1%, Respectively.

جدول ۹. ضرایب رگرسیون صفات مؤثر بر عملکرد شکر سفید در شرایط تنفس کم آبیاری بر اساس مدل رگرسیونی گام به گام

Table 9. Regression coefficients of traits affecting white sugar yield under water deficit stress conditions based on stepwise regression model

Traits	صفات	ضریب رگرسیون Regression coefficient	ضریب تبیین مدل Model R-Square	ضریب تبیین جزء Partial R-Square
Sugar yield	عملکرد شکر	1.252**	0.9804	0.9804
Extraction coefficient of sugar	ضریب استحصال شکر	0.003ns	0.9974	0.0170
Root yield	عملکرد ریشه	-0.102**	0.9986	0.0012
Sugar content	درصد قند	-0.407**	0.9992	0.0007
Sugar content White	شکر قابل استحصال	0.320**	0.9998	0.0005
Intercept	عرض از مبدأ	3.165**		

ns, \*and\*\*: None significant and significant at 5 and 1%, Respectively.

جدول ۱۰. تجزیه علیت همبستگی عملکرد شکر سفید در شرایط بدون تنفس با صفات باقیمانده در مدل رگرسیونی گام به گام

Table 10. Path coefficient analysis of white sugar yield with the remaining characters in the stepwise regression model under normal conditions

Trait	صفت	اثر مستقیم Direct effect	اثر غیرمستقیم از طریق by Indirect effect					ضریب همبستگی با عملکرد شکر سفید Correlation coefficient with yield	
			1	2	3	4	5		
1 Sugar yield	عملکرد شکر	-0.325	-	0.176	-0.027	1.112	0.012	0.95**	
2 Extraction coefficient of sugar	ضریب استحصال شکر	0.463	-0.124	-	-0.080	0.187	0.021	0.47**	
3 Molasses sugar	درصد قند ملاس	0.081	0.103	-0.450	-	-0.164	0.017	-0.41**	
4 Root yield	عملکرد ریشه	1.170	-0.309	0.074	-0.012	-	0.004	0.93**	
5 Sugar content	درصد قند	0.026	-0.146	0.375	0.054	0.199	-	0.51**	
Residual effect=0.145					اثر باقیمانده = ۰/۱۴۵				

\*\*: Significant at 1%.

\*: معنی دار در سطح احتمال یک درصد.

جدول ۱۱- تجزیه علیت همبستگی عملکرد شکر سفید در شرایط تنفس کم آبیاری با صفات باقیمانده در مدل رگرسیون گام به گام  
Table 11. Path coefficient analysis of white sugar yield with the remaining characters in the stepwise regression model under water deficit stress conditions

Trait	صفت	اثر مستقیم Direct effect	by Indirect effect					ضریب همبستگی با عملکرد شکر سفید Correlation coefficient with yield
			1	2	3	4	5	
1 Sugar yield	عملکرد شکر	0.895	-	-0.310	0.002	-0.183	0.304	0.99**
2 Extraction coefficient of sugar	ضریب استحصال شکر	-0.062	0.438	-	0.000	-0.264	0.485	0.60**
3 Root yield	عملکرد ریشه	0.002	0.868	-0.020	-	-0.114	0.192	0.93**
4 Sugar content	درصد قند	-0.326	0.501	-0.050	0.000	-	0.522	0.65**
5 White Sugar content	شکر قابل استحصال	0.533	0.510	-0.057	0.000	-0.320	-	0.67**
Residual effect=0.042								اثر باقیمانده = ۰/۰۴۲

\*\*: Significant at 1%.

\*: معنی دار در سطح احتمال یک درصد.

همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد شکر سفید با عملکرد ریشه، درصد قند، عملکرد شکر، شکر قابل استحصال و ضریب استحصال شکر نشان می دهد که از این صفات می توان به عنوان فاکتورهای انتخاب ژنتیکی های چغندرقدنده متتحمل به تنفس کم آبیاری استفاده نمود. درنهایت، در بین هیبریدهای موردمطالعه، هیبریدهای (7112\*SB36)\*S1-71 (7112\*SB36)\*S1-72 (7112\*SB36)\*S1-66 و (7112\*SB36)\*S1-73 که هم از لحاظ شاخص تحمل به تنفس (STI) و هم از لحاظ صفات عملکردی در شرایط تنفس برتر بودند، به ترتیب به عنوان متتحمل ترین هیبریدها به تنفس کم آبیاری معرفی شدند.

به طور کلی نتایج نشان داد که تنفس کم آبیاری اثر بسیار معنی داری بر کلیه صفات موردمطالعه در ژنتیکی های تست کراس چغندرقدنده داشت. بین ۱۱ صفت مرتبه با تحمل به کم آبیاری که در این تحقیق بررسی گردید صفات عملکرد ریشه، عملکرد شکر، ضریب قلیائیت، شکر قابل استحصال، عملکرد شکر سفید و ضریب استحصال شکر در اثر تنفس کم آبیاری کاهش یافت. در حالی که تنفس کم آبیاری باعث افزایش صفاتی از قبیل درصد قند، میزان سدیم، پتاسیم، نیتروژن مضره و قند ملاس شد. ژنتیکی های موردمطالعه در این تحقیق اختلاف کاملاً معنی دار از نظر همه صفات موردمطالعه نشان دادند که بیانگر وجود تنوع کافی در بین آنها است. وجود

## منابع

- Abdollahian Noghabi, M., Radaei-al-amoli, Z., Akbari, G.A., Sadat Nuri, S.A., 2011. Effect of sever water stress on morphological, quantitative and qualitative characteristics of 20 sugar beet genotypes. Iranian Journal of Crop Sciences. 42, 453-464. [In Persian with English Summary].
- Abdollahian Noghabi, M., Sheikholeslami, R., Babaei, B., 2005. Terms and definitions of technological quantity and quality of sugar beet. Journal of Sugar Beet. 21, 101-104. [In Persian with English Summary].
- Ahmad, P., Jamsheed, S., Hameed, A., Saima, R., Sharma, S., Azooz, M.M., Hasanuzzaman, M. 2014. Drought Stress Induced. In: Ahmad, P. (ed.), Oxidative Damage and Antioxidants in Plants Oxidative Damage to Plants: Antioxidant Networks and Signaling, Drought Stress Induced Oxidative Damage and Antioxidants in Plants. Academic Press, Massachusetts, USA, pp. 345-367.
- Ahmadi, M., Majidi Heravan, E., Sadeghian, S.Y., Mesbah, M., Darvish, F., 2011. Drought tolerance variability in S1 pollinator lines

- developed from a sugar beet open population. *Euphytica*. 178, 339-349.
- Farshadfar, A., 2000. Principal and Method of Multivariate Statistic. University of Razi Kermanshah Press. [In Persian].
- Fazli, H., Sadeghian, S.Y., Mohammadian, R., 1998. Importance of quantitative and qualitative characters of sugar beet in breeding for drought tolerance. The 5<sup>th</sup> Iranian Crop Science Congress. Karaj. pp. 246-247. [In Persian].
- Fernandez, G.C.J., 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance, In: Kuo CG (Ed.), Adaptation of Food Crops to Temperature and Water-Stress, VRDC, Shanhua, Taiwan. pp. 257-270.
- Fotouhi, K., Ali Ahmad, J., Nourjou, A., Pedram, A., Khorshid, A., 2008. Irrigation management based on allowed water depletion at different growth stages of sugar beet in Miyandoab region. *Journal of Sugar Beet*. 24, 43-60. [In Persian with English Summary].
- Foroozesh, P., Majidi Heravan, E., Bihamta, M.R., Fatollah Taleghani, D., Habibi, D., 2012. Physiological evaluation of sugar beet genotypes under drought stress. *American-Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science*. 12, 820-826.
- Gavuzzi, P.R., Palumbo, M., Campanile, R.G., Ricciard, G.L., Borgh, B., 1997. Evaluation of field and laboratory predictor of drought and heat tolerance in winter cereals. *Canadian Journal of Plant Science*. 77, 523-531.
- Ghafari, E., Rajabi, A., Izadi Darbandi, A., Rozbeh, F., Amiri, R., 2016. Evaluation of new sugar beet monogerm hybrids for drought tolerance. *Journal of Crop Breeding*. 8, 8-16. [In Persian with English Summary].
- Hamidi, H., Ahmadi, M., Ramezanpour, S., Masoumi, A., Khorramian, S., 2018. Estimation of heterosis and heritability of drought stress tolerance in test cross genotypes of sugar beet. *Environmental Stresses in Crop Sciences*. 11, 275-288. [In Persian with English Summary].
- Hekamat Shoar, H., 1992. Plant physiology in difficult situation. Tabriz University Press. [In Persian with English Summary].
- Khajepur, M.R., 1998. Industrial crops. SID publishers. Industrial University of Isfahan. pp. 450. [In Persian with English Summary].
- Kheirabi J., 1995. Analysis of low irrigation. Define and explained. *Journal of Water, Soil and Machine*. 13, 16-24.
- Kirda, C., 2002. Deficit irrigation scheduling based on plant growth stages showing water stress tolerance. In: Deficit Irrigation Practices. FAO.
- Koocheki, A., Soltani, A., 1996. Sugar beet Agronomy. Jihade-Daneshgahi Press of Mashhad. 200p. [In Persian].
- Koocheki, A., Soltani, A., Azizi, M., 2003. Plant ecophysiology. Publications University of Mashhad. pp. 272. [In Persian].
- Mirzaee, M.R., and Rezvani, S.M.A., 2007. Effects of water deficit on quality of sugar beet at different growth stages. *Journal of Sugar Beet*. 23, 29-42. [In Persian with English Summary].
- Mohammadian, R., Sadeghian, S.Y., Moghadam, M., Rahimian, H., 2003. Evaluation of drought tolerance indices in determining sugar beet genotypes early season drought conditions. *Journal of Sugar Beet*. 18, 29-49. [In Persian with English Summary].
- Nasri, R., Kashani, A., Paknejad, F., Sadeghi-Shojae, M., Ghorbani, S., 2012. Correlation and path analysis of qualitative and quantitative yield in sugar beet in transplant and direct sowing methods in saline lands. *Journal of Agronomy and Plant Breeding*. 8, 213-226. [In Persian with English Summary].
- Nourjoo, A., Baghaee Kia, M., 2004. Study on the irrigation cut-off effects at different growth stages on quantity and quality of sugar beet in Khoy region. *Journal of Sugar Beet*. 20, 27-38. [In Persian with English Summary].
- Orazizadeh, M.R., Rajabi, A., Ahmadi, M., 2016. Selection of drought-tolerant half-sib families in sugar beet. *Journal of Sugar Beet*. 32, 1-12. [In Persian with English Summary].
- Oroojnia, S., Habibi, D., Taleghani, D.F., Safari Dolatabadi, S., Pazoki, A., Moaveni, P., Rahmani, M., Farshidi, M., 2012. Evaluation of yield and yield components of different sugar beet genotypes under drought stress. *Journal of Agronomy and Plant Breeding*. 8, 127-144. [In Persian with English Summary].
- Ouda Sohier, M.M., 2005. Yield and quality of sugar beet as affected by planting density and nitrogen fertilizer levels in the newly reclaimed soil. *Zagazig Journal of Agricultural Research*. 32, 701-715.

- Parvizi Almani, M., Abd-Mishani, C., Yazdi Samadi, B., 1997. Study on drought resistance in sugar beet genotypes. *Iranian Journal of Agriculture Science.* 288, 15-25. [In Persian].
- Rajabi, A., Vahidi, H., Haj Seyed Hadi, M.R., Fathollah Taleghani, D., 2013. Study on drought tolerance and interrelationships among some agronomic and morphophysiological traits in sugar beet lines. *International Journal of Agriculture and Crop Sciences.* 5, 761-768.
- Sadeghian, S.Y., Fazli, H., Mohammadian, R. Talaghani, D.F., Mesbah, M., 2000. Genetic variation for drought stress in sugar beet. *Journal of Sugar Beet Research.* 37, 55-77.
- Sadeghzadeh Hemayati, S., Fasahat, P., 2016. Evaluation of drought tolerance indices and their correlation in sugar beet lines. *Journal of Sugar Beet.* 32, 13-27. [In Persian with English Summary].
- Vazan, S., 2002. Study on the effect of drought stress on the rate of abscisic acid accumulation and other physiological traits in sugar beet. Ph.D thesis. Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran. 212p. [In Persian].
- Westage, M., Boyer, J., 1985. Osmotic adjustment and the inhibition of leaf, root, stem and silk growth at low water potentials in maize. *Planta.* 164, 459-540.
- Yan, W., Kang, M.S., 2002. GGE biplot analysis: A graphical tool for breeders, geneticists and agronomists. CRC press, Florida, USA, 267p.

*Original article*

## Evaluation of drought tolerance in sugar beet test cross hybrids under water deficit stress

H. Hamidi<sup>1</sup>, S.S. Ramezanpour<sup>2\*</sup>, M. Ahmadi<sup>3</sup>, H. Soltanloo<sup>2</sup>

1. Ph.D. Graduate of Plant Breeding, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

2. Associate Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

3. Associate Professor, Sugar Beet Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran

Received 10 February 2019; Accepted 6 April 2019

### Abstract

This experiment was conducted to evaluate the drought tolerance of sugar beet test cross hybrids (57 hybrids) with seven controls including IR7, Mandarin, Jolgeh, Paya, Fotora, SC (7112\*SB36) and origin population) in Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center in two separate experiments under field conditions with unbalanced lattice design (8×8) with four replications in 2016. Irrigation was done routinely up to the thinning. Subsequent irrigations were done after 90 mm and 200 mm evaporation from the class A evaporation pan in non-stress and water deficit stress conditions, respectively. In this research, traits such as root yield, sugar content, sugar yield, Na, K, N, alkalinity, molasses sugar, white sugar content, white sugar yield and extraction coefficient of sugar were measured. Combined analysis of variance showed that there was a significant difference ( $p \leq 0.01$ ) among studied genotypes and different irrigation regimes for all traits. The highest white sugar yield in non-stress and water deficit stress conditions were observed in (7112\*SB36)\*S1-73 (13.34 ton.ha<sup>-1</sup>) and Mandarin (9.37 ton.ha<sup>-1</sup>), respectively. Correlation analysis revealed that the relationship between white sugar yield with root yield, sugar content, sugar yield, white sugar content and extraction coefficient of sugar was significantly positive in two conditions, while its correlation with Na, K, alkalinity and molasses sugar was significantly negative. According to the results of the stepwise regression analysis, more than 99 percent of white sugar yield variation was explained by sugar yield, extraction coefficient of sugar, root yield and sugar content in non-stress and drought stress conditions. Also the results showed that in non-stress, root yield (1.17) and in stress conditions, sugar yield (0.89) had the most direct effect on white sugar yield. Finally, (7112\*SB36)\*S1-73, (7112\*SB36)\*S1-66 and (7112\*SB36)\*S1-72, which were superior in terms of stress tolerance index (STI) and also in terms of yield traits in stress condition, were introduced as the most drought tolerant hybrids.

**Keywords:** Drought stress, Hybrid, Stress tolerance index, White sugar yield

\*Correspondent author: Seyede Sanaz Ramezanpour; E-Mail: ramezanpours@gau.ac.ir.