

بررسی تأثیر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت‌ها، رنگ‌دانه‌های فتوستنتزی و رشد چند رقم و لاین ارزن دمروبا (Setaria italica L.)

- مسعود خزاعی^{۱*}، محمد گلوبی^۲، مهدی دهمردی^۳، سید محسن موسوی‌نیک^۴، فیضه مهدی‌نژاد^۵. دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل و کارشناس ارشد آموزشی دانشگاه بیرجند.
۱. استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.
۲. دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.
۳. دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
۴. دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
۵. استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.

تاریخ دریافت: ۹۴/۱/۱۸؛ تاریخ پذیرش: ۹۴/۱/۱۹

چکیده

مقدمه

تنش خشکی از مهم‌ترین فاکتورهای محدودکننده رشد و تولید گیاهان محسوب می‌شوند و منجر به کاهش بیش از ۵۰ درصدی در میانگین تولید اکثر محصولات در سرتاسر جهان می‌شود. یک استراتژی سودمند به منظور اجتناب از وارد آمدن خسارات تنش خشکی به گیاهان کاشت گیاهان مقاوم به خشکی است. یک پیشنهاد مناسب و متداول استفاده از گیاهان چهارکرینه نظری ارزن است که مقاومت نسبتاً زیادی به کمبود آب دارد. تنش خشکی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفو‌لوجیکی نظری تنظیم‌کننده‌های اسمزی، محتوی کلروفیل، ارتفاع بوته و طول خوشة را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شناخت مبانی فیزیولوژیکی و مورفو‌لوجیکی مقاومت به تنش در این گیاه و ارتباط آن‌ها با عملکرد می‌تواند کمک زیاد به شناخت و توسعه کاشت گیاهان مقاوم به خشکی نماید. هدف از این آزمایش بررسی تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفو‌لوجیکی در سه رقم ارزن است.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال زراعی ۹۲-۹۳ به صورت کرت‌های خردشده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. سطوح مختلف تنش خشکی شامل تأمین ۷۵، ۵۰، ۳۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی (به ترتیب تنش شدید، تنش متوسط و بدون تنش) به عنوان عامل اصلی و ارفاق ارزن دمروبا (شامل رقم kfm5 و لاین‌های kfm20) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. اندازه‌گیری اسمولیت‌ها و رنگ‌دانه‌های فتوستنتزی در ۳۰ و ۴۵ روز بعد از اعمال تنش انجام شد. خصوصیات مورفو‌لوجیکی، عملکرد و اجزای آن در زمان رسیدگی و بلوغ اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS 9.1 و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون توکی در سطح معنی‌داری ۵٪ انجام شد.

نتایج

نتایج نشان داد که در مراحل مختلف رشد تنش خشکی منجر به افزایش پرولین، کربوهیدرات‌های محلول و کاهش رنگ‌دانه‌های فتوستنتزی و کارتوئیدها در مقایسه با تیمار شاهد گردید. تنش خشکی باعث کاهش ارتفاع بوته، طول میانگره و طول خوشة، تعداد خوشه در مترمربع، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه و عملکرد را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد ولی تأثیری بر تعداد گره نداشت. بالاترین و کمترین عملکرد دانه ۴۶۱/۸۸ و ۱۷۱/۰۸ گرم در مترمربع به ترتیب مربوط به تیمار بدون تنش و تنش شدید بود. این نتایج دلالت بر آن دارد که ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه تأثیر مثبت بر عملکرد دانه در ارزن دارد و افزایش آن‌ها باعث افزایش عملکرد دانه شد. بر طبق نتایج بدست آمده کاهش ارتفاع، اسمولیت‌های سازگار و کارتوئیدها مکانیزم‌های سازگاری و مقاومت به خشکی محسوب می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: تنظیم اسمزی، پرولین، فندهای محلول، خصوصیات مورفو‌لوجیکی، اجزای عملکرد

مقدمه

مکانیسم‌های تنظیم اسمزی ناشی از تجمع محلول‌های سازگار نظیر پرولین و هیدرات‌کربن در سیتوپلاسم به دست آید (Ajithkumarand and Panneerselvam, 2013) پرولین علاوه بر خصوصیات اسمولیتی، یک آنتی‌اسیدان قوی و دارای توان بازدارندگی مرگ برنامه‌ریزی شده سلول نیز محسوب می‌شود. مدارک بهخوبی نشان می‌دهد که به دنبال تنش خشکی و شوری، بروز تنش اکسیداتیو منجر به تجمع قابل‌توجه پرولین می‌شود که می‌تواند ناشی از افزایش در سنتز پرولین و یا کاهش از هم‌پاشیدگی آن باشد. پرولین آزاد به عنوان یک محافظ اسمزی، پایدارکننده پروتئین، کلات کننده فلز، ممانعت کننده از پراکسیداسیون چربی و نیز پاکسازی کننده هیدروکسیل و اکسیژن نوزاد عمل می‌کند (Ashraf, 2007; Trovata, 2008).

آنواع رنگدانه‌های فتوسنتزی شامل کلروفیل a, b و نیز کارتنتوئیدها در معرض خسارات خشکی می‌باشند. علاوه بر این تنش خشکی تعییراتی را نیز در نسبت کلروفیل a به b و کارتنتوئیدها باعث می‌شود (Farooq et al., 2009; Anjum et al., 2003). محتوى کلروفیل کل نیز در شرایط Jaleel et al., 2001 در شرایط تنش گیاهان چندین مکانیسم برای دفع انرژی اضافی فتوسنتزی دارند که این مکانیسم‌ها نقش زیادی در مقاومت به خشکی گیاهان دارند. در همه موجودات فتوسنتز کننده کارتنتوئیدها نظیر بتاکاروتون و زنگزانتین و توکوفرول‌ها به عنوان ترکیبات محافظ نوری مهم بشمار می‌آیند که از طریق پراکننده کردن انرژی برانگیخته شده به صورت گرم و یا از طریق پاکسازی گونه‌های فعال اکسیژن و نیز خنثی کردن پراکسیداسیون چربی ایفای نقش می‌کنند. کارتنتوئیدها یک نقش کلیدی در این سیستم دفاع آنتی‌اسیدانی در گیاه دارند ولی در برابر خسارت اکسیداتیو خیلی مستعد نیز هستند و تنش خشکی از طریق تولید گونه‌های فعال اکسیژن همراه با کاهش غلظت کلروفیل غلظت کارتنتوئیدها را نیز کاهش می‌دهد (Reddy et al., 2004).

عملکرد در ارزن تابعی از تعداد پانیکول در واحد سطح، تعداد دانه در پانیکول و وزن هزار دانه است که تحت تأثیر ژنوتیپ و محیط قرار می‌گیرد و به توصیف عملکرد کمک می‌کنند. ژنوتیپ بر توانایی ظهور پنجه، تعداد گل و تعداد گلی که به دانه تبدیل می‌شود و نیز تخصیص مواد

تعییرات جهانی اقلیم و الگوی بارندگی، باعث توسعه نواحی خشک شده است (Xoconstle-Cazares et al., 2010).

بر اساس داده‌های اقلیمی شبیه‌سازی شده در ایران نیز برای ۳۰ سال آینده افزایش خشکی پیش‌بینی شده است (Khazanедari et al., 2009) گیاهان در طبیعت بارها در معرض انواع تنش قرار می‌گیرند که تنش خشکی از مهم‌ترین فاکتورهای محدودکننده رشد و تولید گیاهان محسوب شده و منجر به کاهش بیش از ۵۰ درصدی میانگین تولید اکثر محصولات در سرتاسر جهان می‌شود (Lata et al., 2011). مقاومت گیاهان به تنش به علت پیچیده بودن اثرات متقابل بین فاکتورهای تنش و نیز تنوع پدیده‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی مؤثر بر رشد و نمو گیاه بسیار پیچیده است (Razmjoo et al., 2008) و بنابراین شناخت آثار تنش خشکی و نیز انتخاب ارقام مقاوم Hui-Ping et al., 2012).

اصلاح و توسعه کاشت گیاهان مقاوم به خشکی می‌تواند یک راهکار سودمند به‌منظور اجتناب از وارد آمدن خسارت تنش خشکی به گیاهان باشد (Vitkauskaitė and Venskaityte, 2011). یک پیشنهاد مناسب استفاده از گیاهان چهارکربنی نظیر ذرت، سورگم و ارزن است که به‌واسطه قدرت باروری بالا (Venskaityte, 2011)، ارزش غذایی و مقاومت نسبتاً زیاد به کمبود آب (Liu et al., 2004; Osborne and Liu et al., 2004; Osborne and Freckleton, 2009)، سازگاری خوبی با نواحی گرم و خشک دارند.

تنش آب نه تنها بر مورفولوژی گیاه تأثیر می‌گذارد بلکه شدیداً متابولیسم و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گیاهان سازوکارهای سازگاری متفاوتی در پاسخ به تنش‌های غیرزنده محیطی نظیر آب کشیدگی دارند. این مکانیسم سازگاری شامل تعییر در فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی است که در بین آن‌ها تجمع محلول‌های آلی سازگار بیشتر موردنظر است (Mohammadkhani and Heidari, 2008).

خشکی منجر به تجمع چند محلول آلی سازگار نظیر قندها، Mohammadkhani and Heidari, 2008 پتانسیل آب گیاه برای ادامه رشد ضروری است و این می‌تواند از طریق

بستگی به قابلیت دسترسی آب در طول این مراحل دارد (Akram, 2011)

همه مراحل رشد گیاه حساسیت یکسانی به کمبود آب ندارند. برخی مراحل رشد از طریق ذخیره آب با کمبود آب مقابله می‌کنند در حالی که مراحل دیگر حساس‌تر بوده و ذخیره آب در چنین مراحلی نقشی در جبران کاهش عملکرد ندارد. تنش رطوبتی در مراحل رشد می‌تواند باعث کاهش زیست‌توده، توانایی پنجه‌زنی، تعداد دانه در خوش و اندازه دانه شود و میزان تأثیر بستگی به شدت و مدت تنش دارد (Bukhat, 2005). قرار گرفتن در معرض تنش آب در مراحل انتهایی رشد ممکن است باعث کاهش در تعداد دانه در خوش و وزن دانه غلات شود (Gupta et al., 2001; Dencic et al., 2000).

بهمنظور درک پاسخ‌های فیزیولوژیک گیاهان به تنش خشکی و تأثیر آن بر عملکرد، آزمایشی با هدف بررسی تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های فیزیولوژیک و عملکرد سه رقم و لاین امیدبخش ارزن دمروباہی اجرا گردید.

مواد و روش‌ها

بهمنظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و مورفوولوژیک در یک رقم و دو لاین امیدبخش ارزن دمروباہی آزمایش در سال زراعی ۹۲-۹۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند (عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۵۳ دقیقه و طول جغرافیایی ۵۹ درجه و ۱۳ دقیقه و ارتفاع ۱۳۸۱ متر از سطح دریا با میانگین بارندگی سالیانه ۱۴۷ میلی‌متر) انجام شد. قبل از کاشت نمونه‌گیری از خاک در عمق صفر تا ۳۰ سانتی‌متر انجام شد. عملیات تهیه زمین شامل شخم پاییزه و بهاره و دیسک و تسطیح در بهار ۹۳ انجام و کودپاشی بر اساس نتایج آزمون خاک از منابع اوره، فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم (به ترتیب به میزان ۲۵۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ کیلو در هکتار) انجام شد. کود فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم قبل از کاشت و کود اوره ۱۵۰ کیلو همزمان با کاشت و باقیمانده در شروع ساقه‌دهی به زمین اضافه گردید. کاشت در اوایل تیرماه صورت گرفت. آزمایش بهصورت کرت‌های خردشده در قالب بلوك‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. سطوح مختلف تنش خشکی شامل (۱) شرایط آبیاری نرمال بر اساس ۱۰۰ درصد تأمین نیاز آبی ارزن (بدون تنش)، (۲) آبیاری با تأمین ۷۵ درصد نیاز آبی (تنش

فتوسنترزی تأثیر می‌گذارد. محیط نیز توانایی بروز پتانسیل ژنتیکی گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آب و سایر فاکتورهای محیطی از طریق تأثیر بر اجزای عملکرد باعث کاهش عملکرد می‌شوند. شدت تغییرات بستگی به رقم، مرحله رشد، دوام و شدت تنش دارد (Mark and Antony, 2005; Akram, 2011).

تحقیقات نشان داده است که ارتباط مثبت و معنی‌داری بین عملکرد دانه و تعداد سنبله وجود دارد (Shooshi et al., 2011; Channappagoudar et al., 2008). در تحقیقی دیگر صفات مؤثر بر عملکرد در ژنوتیپ ارزن مورد بررسی قرار گرفت و گزارش شد ارتفاع بوته، طول پانیکول و عملکرد علوفه همبستگی معنی‌داری با عملکرد دانه داشتند (Santhakumar, 1999). تنش در دوره رشد رویشی از طریق کاهش سطح برگ فعال فتوسنترزی و در دوره زایشی از طریق کاهش طول دوره رشدی باعث کاهش عملکرد دانه می‌شود (Alizadeh et al., 2007). افزایش فواصل آبیاری در ارزن باعث کاهش عملکرد علوفه تازه و خشک شد (Heidari Zooleh et al., 2011; Keshavars et al., 2012; Keshavars et al., 2013). مطالعات زیادی نشان داد که تنش آب در مرحله گلدهی، گردهافشانی را کاهش می‌دهد و بنابراین تعداد دانه تشکیل شده در خوش‌بافت و منجر به کاهش عملکرد دانه می‌شود (Maqsood and Azam, 2007; Seghatoleslam et al., 2008; Akram, 2011). آب کافی در طول دوره گلدهی نه تنها اجازه می‌دهد سرعت فتوسنتر افزایش یابد بلکه زمان زیادی بهمنظور انتقال کربوهیدرات‌ها به دانه تخصیص می‌دهد که اندازه دانه را بهبود می‌بخشد و درنتیجه منجر به افزایش عملکرد دانه می‌شود (Zhang and Oweis, 1998). نتایج تحقیقات نشان داد که تنش آب سه هفته بعد از گردهافشانی هیچ تأثیری بر تعداد دانه در پانیکول در گیاه ارزن نداشت اما وزن هزار دانه را کاهش داد (Mahalaka and Bidner, 1985; Davoodi et al., 2013). کاهش وزن دانه در این مرحله به علت کاهش فتوسنتر ناشی از کاهش سطح برگ فعال و نیز کاهش انتقال مواد فتوسنترزی به علت کمبود آب است. وقتی خشکی در مراحل مختلف رشد نظیر پنجه‌دهی، ساقه‌دهی، خوش‌دهی، گلدهی و مراحل نمو دانه به گیاه تحمیل می‌شود، کاهش در سرعت رشد از طریق کاهش در کارایی مصرف نور ایجاد می‌شود و کارایی بهتر محصول

جدول (۱) نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک را در ارقام ارزن تحت تیمار تشخیص نشان می‌دهد. اثر متقابل بین تیمار تشخیص و ارقام در تمامی صفات موردمطالعه به‌جز طول خوش در سطح معنی‌داری ۵٪ از نظر آماری معنی‌دار نشد. معنی‌دار نبودن اثر متقابل تیمارها دلالت بر آن دارد که تشخیص تأثیر مشابهی بر صفات مورفولوژیک در ارقام موردمطالعه داشته است. با افزایش KFM5 شدت تشخیص طول خوش در رقم باستان و لاین کاهش یافت ولی تشخیص تأثیری بر طول خوش لاین KFM20 نداشت. علت این موضوع احتمالاً اختلاف ژنتیکی ارقام از نظر طول خوش است. اثر تشخیص نشان می‌گیرد که ارتفاع بوته در سطح معنی‌داری ۱٪ از نظر آماری معنی‌دار شد (جدول ۱). بیشترین و کمترین ارتفاع بوته به ترتیب مربوط به تیمار آبیاری نرمال یعنی ۱۰۰٪ درصد تأمین نیاز رطوبتی به میزان ۱۰/۸/۱۱ و تیمار تشخیص شدید به میزان ۷۴/۴۴ سانتی‌متر بود (جدول ۲). تشخیص تأثیر معنی‌داری بر طول میانگره داشت ولی بر تعداد گره در ساقه تأثیر معنی‌داری نداشت که نشان می‌دهد کاهش ارتفاع در تیمار تشخیص مربوط به کاهش طول میانگره بوده است. تأثیر تشخیص بر قطر ساقه معنی‌دار نبود. بین ارقام و لاین‌های موردمطالعه نیز از نظر تمام صفات مورفولوژیک موربدبررسی به‌جز ارتفاع اختلاف معنی‌داری وجود داشت (جدول ۱). بیشترین طول میانگره مربوط به رقم KFM20، بیشترین تعداد گره مربوط به رقم باستان و بیشترین طول خوش را رقم KFM5 داشت درنتیجه ارقام از نظر ارتفاع بوته اختلاف معنی‌داری نداشتند (جدول ۲).

تأثیر تشخیص نشان می‌گیرد

اثر متقابل بین تیمار تشخیص و ارقام بر میزان پرولین در کوتاه‌مدت و بلندمدت در سطح معنی‌داری ۵٪ از نظر آماری معنی‌دار نشد (جدول ۳). معنی‌دار نبودن اثر متقابل تیمارها دلالت بر آن دارد که تشخیص تأثیر مشابهی بر میزان پرولین در ارقام موردمطالعه داشته است.

تحت شرایط خشکی در همه تیمارهای تشخیص محفوظ‌کننده اسمزی پرولین در مقایسه با شاهد و در مراحل مختلف رشد ارزن افزایش یافت (جدول ۴). بالاترین سطح پرولین در برگ‌های ارزن در ۳۰ و ۴۵ روز بعد از اعمال تشخیص (۷۰ روز بعد از کاشت) به ترتیب ۱۱/۱۰ و ۱۱/۱۰ میلی‌گرم در وزن تازه (mg/FW) بود. بین ارقام

متوسط)، و (۳) آبیاری با تأمین ۵۰ درصد نیاز آبی (تشخیص شدید) به عنوان عامل اصلی و ارقام و لاین‌های ارزن DM-روباخی (شامل رقم باستان و لاین‌های kfm5 و kfm20) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. هر کرت شامل ۴ خط به طول ۶ متر بود و فاصله بین خطوط ۵۰ سانتی‌متر و فاصله بوتهای روی ردیفهای کاشت ۴ سانتی‌متر در نظر گرفته شد. بین هر کرت فرعی و کرت مجاور یک خط نکاشت و بین کرت‌های اصلی ۱/۵ متر فاصله در نظر گرفته شد. آبیاری تا مرحله ۴ برگی به صورت معمول انجام شد و در این مرحله تشخیص مطابق با تیمار موردنظر و بر اساس میزان آب تبخیر شده از تشک تبخیر در زمان ۶۰ درصد FAO تخلیه رطوبتی اعمال گردید. نیاز آبی به کمک روش با استفاده از آمار تبخیر از تشک کلاس A و با در نظر گرفتن راندمان ۸۰ درصد برای پخش آب در سطح کرتهای تعیین شد. کنترل علفهای هرز به صورت وجین دستی انجام شد.

اندازه‌گیری صفات مورفولوژیکی شامل ارتفاع بوته، تعداد گره، طول میانگره، قطر ساقه، طول و قطر خوش، در هر کرت بر روی ۵ بوته که به طور تصادفی انتخاب و ایکت گذاری شده بود صورت گرفت. شاخصهای فیزیولوژیک شامل مقدار کربوهیدرات محلول روش اسیدسولفوریک Bates et al., (Schlegel, 1956)، میزان پرولین روش بیتس (Sairam and Saxena, 1973) در دو نوبت ۳۰ و ۴۵ روز بعد از تشخیص اندازه‌گیری شد. در زمان رسیدگی از دو خط میانی پس از حذف ۵/۰ متر ابتدا و انتهای هر کرت به صورت تصادفی برداشت از سطح یک مترمربع به صورت برش از سطح خاک انجام شد و عملکرد دانه و بیولوژیک پس از جدا نمودن و توزین برای هر کرت بر حسب کیلوگرم در مترمربع محاسبه شد. اجزای عملکرد شامل تعداد پانیکول در مترمربع، تعداد دانه در پانیکول و وزن هزار دانه به طور تصادفی از ۳ بوته برداشت شده محاسبه شد. پس از جمع آوری داده‌ها عملکرد و اجزای عملکرد با استفاده از نرم‌افزار SAS نسخه ۹/۱ مورد تجزیه واریانس قرار گرفت. میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون میانگین حداقل مربعات توکی در سطح احتمال ۵ درصد مقایسه شد.

نتایج و بحث
تأثیر خشکی بر صفات مورفولوژیک

موردمطالعه داشت. تحت شرایط خشکی میزان کربوهیدرات محلول در همه تیمارهای تنش در مقایسه با شاهد در مراحل مختلف رشد / وزن افزایش یافت. بالاترین سطح کربوهیدرات در برگ‌های ارزن در ۳۰ و ۴۵ روز بعد از اعمال تنش و ۶۰ و ۷۰ روز بعد از کاشت در تنش شدید به ترتیب (mg/FW) ۸۵/۱۱ و ۱۰۱/۱۱ میلی‌گرم در وزن تازه برگ (جدول ۴).

موردمطالعه نیز از نظر میزان پرولین در هر دو مرحله رشدی اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. بیشترین میزان پرولین در KFM20 و ۴۵ روز بعد از تنش به ترتیب مربوط به رقم KFM20 و KFM5 بود (جدول ۴).

میزان کربوهیدرات محلول اثر متقابل بین تیمار تنش و ارقام بر میزان کربوهیدرات محلول در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در سطح معنی‌داری ۵٪ از نظر آماری معنی‌دار نبود (جدول ۳)، معنی‌دار نبودن اثر متقابل تیمارها دلالت بر آن دارد که تنش تأثیر مشابهی بر میزان کربوهیدرات در ارقام

جدول ۱. تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورفولوژیک موردمطالعه در ارزن.

Table 1. Analysis of variance (Mean of squares) of studied traits in Millet

Source of variation	منابع تغییر	درجه آزادی df	طول میانگره Internode length	تعداد گره Node no.	ارتفاع بوته Plant height	طول خوش Ear length	قطر ساقه Plant diameter
Replication	تکرار	3	3.67	2.00	43.28	0.88	0.31
Stress (S)	تنش	2	49.33**	0.59	3400.34**	16.59*	0.18
Error a	خطای الف	6	49.32	0.85	111.43	3.51	0.17
Cultivar (C)	رقم	2	11.36*	17.33**	387.75	300.44 **	6.55 **
S × C	تنش × رقم	4	4.93	0.81	138.27	16.59 **	0.13
Error b	خطای ب	18	2.16	1.45	144.23	3.42	0.17
CV (%)	ضریب تغییرات (%)		14.58	13.08	13.15	9.67	14.08

* و ** به ترتیب نشان‌دهنده معنی‌داری در سطح ۰/۰۵ و ۰/۰۱ درصد

* and ** means significant at 0.05 and 0.01 probability level respectively

جدول ۲. مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک موردمطالعه در ارزن.

Table 2. Mean comparison of studied morphological traits in Millet.

Treatments	تیمارها	طول میانگره Internode length (cm)	تعداد گره Node no.	ارتفاع بوته Plant height (cm)	طول خوش Ear length (cm)	قطر ساقه Plant diameter (mm)
Cultivar	ارقام					
Bastan	bastan	8.99 b	10.55a	95.22a	16.22b	3.72a
Kfm5	Kfm5	10.84a	8.88b	93.88a	24.88a	3.06b
Kfm20	Kfm20	10.42ab	8.22b	84.77a	16.22b	2.24c
Stress	تنش					
No stress	بدون تنش	11.91a	9.22a	108.11a	20.44a	3.12a
Moderate stress	تنش ملایم	10.44b	9.00a	91.33b	18.66ab	2.88a
Severe stress	تنش شدید	7.90c	9.44a	74.44c	18.22b	3.03a

میانگین‌های دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون توکی در سطح معنی‌داری ۵ درصد دارای تفاوت معنی‌دار نمی‌باشند.

Means followed by the same letters in each column are not significant different at the 5% level according to tukey no stress, medium stress and severe stress are 100, 75 and 50 percent plant water requirement respectively.

جدول ۳. تجزیه واریانس (میانگین مربوط) صفات فیزیولوژیک مورد مطالعه در ارزن در ۳۰ و ۴۵ روز پس از اعمال تنش.

S.O.V	درجه حریج	آزادی منابع تغییر	df	درجه حریج		کربوهیدرات	کلروفیل a	کلروفیل b	کلروفیل کل	b/a	کل b/chla	کاروتینیدها			
				30	45										
Replication	3	11595.5	2480.3	366.6	275.3	5.35	1.11	0.87	0.14	9.04	0.04	0.008	0.012	47.32	88.72
Tension	2	5969.9*	1067.1*	1271.9*	2573.4*	23.44**	8.86**	5.74**	1.28**	51.97**	16.86**	0.012	0.033**	329.01*	25.72
Stress (S)															
Cultivar (C)	6	1238.9	1736.3	224.4	315.1	0.64	0.15	0.35	0.06	0.88	0.28	0.012	0.001	58.98	141.82
Error a															
Error b															
S × C	4	297.6	1164.2	182.5	2402.4**	0.50	0.45	0.70	0.046	1.43	0.78	0.014	0.002	608.82	558.16**
CV (%)															
CV (%)															

* and ** means significant at 0.05 and 0.01 probability level respectively

* به ترتیب نشان‌دهنده معنی‌داری در سطح ۰/۰۱ و ۰/۰۵ درصد

** به ترتیب نشان‌دهنده معنی‌داری در سطح ۰/۰۱ و ۰/۰۵ درصد

جدول ۳۰: مقایسه میانگین صفات فیزیولوژیک مرد عطاءالله در آرزوی رُ ۴۵ و رُ ۴۶ روز پس از اعمال تنش.

Table 4: Mean comparison of studied physiological traits in millet at 30 and 45 days after exerting stress.

Means followed by the same letters in each column are not significant different at the 5% level according to Tukey.

تأثیر خشکی بر رنگدانه‌های فتوسنتزی

نتایج نشان داد که اثر متقابل بین تیمار تنش و ارقام بر میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت در سطح معنی‌داری ۵٪ از نظر آماری معنی‌دار نیست (جدول ۳). معنی‌دار نبودن اثر متقابل تیمارها دلالت بر آن دارد که تنش تأثیر مشابهی بر میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی در ارقام موردمطالعه داشته است. میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی کلروفیل a و b تحت تأثیر تنش خشکی کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (جدول ۴). نسبت کلروفیل a به کلروفیل b (a/b) تحت تنش کوتاه‌مدت تغییر معنی‌داری نداشت، ولی در بلندمدت کاهش یافت. کاهش این نسبت بدان معنی است که تحت تأثیر تنش خسارت کلروفیل b نسبت به کلروفیل a بیشتر بوده است (Fang et al., 1998). ارقام موردمطالعه نیز از نظر میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی اختلاف معنی‌داری نشان دادند. بالاترین میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی در هر دو مرحله مربوط به رقم KFM20 بود (جدول ۴).

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد

در مطالعه حاضر معلوم شد که اثر متقابل تیمارها بر عملکرد و اجزای عملکرد به‌جز تعداد دانه در خوشة معنی‌دار نبود و ارقام موردمطالعه پاسخ مشابهی به افزایش تنش

جدول ۵. تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد و اجزای عملکرد در ارزن.

Table 5. Analysis of variance of yield and component yield in Millet.

Source of variation		درجه آزادی df	متابع تغییر Ears.m ⁻²	تعداد خوشه بارور	تعداد دانه در خوشه Seeds per ear	وزن هزار دانه 1000 seed weight	عملکرد دانه Seed yield
Replication	تکرار	3	969.55		51017.01	0.121	52911.12
Stress (S)	تنش	2	3207.70**		2367431.81**	0.397**	267137.70**
Error a	خطای الف	6	258.63		92591.28	0.010	8452.48
Cultivar (C)	رقم	2	3869.80**		1882464.58**	0.841**	176.39
S × C	تنش × رقم	4	1025.84		207379.78*	0.012	6190.87
Error b	خطای ب	18	660.93		73777.81	0.024	4886.88
CV (%)	ضریب تغییرات (%)		22.84		25.78	5.56	23.52

,* به ترتیب نشان‌دهنده معنی‌داری در سطح ۰/۰۵ و ۰/۰۱ درصد

significant at 0.05 and 0.01 probability level respectively **,***

جدول ۶. مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد در ارزن.

Table 6. Mean comparison of yield and component yield in Millet.

Treatments Cultivar	تیمارها ارقام	تعداد خوش بارور Ears.m ⁻²	تعداد دانه در خوش Seeds per ear	وزن هزار دانه 1000 seed weight (gr)	عملکرد دانه Seed yield (g.m ⁻²)
Bastan	باستان	63.77c	1432.70a	3.07a	293.49a
Kfm5	Kfm5	99.00b	1085.51b	2.74b	296.96a
Kfm20	Kfm20	174.88a	642.49c	2.54c	301.14a
Stress	تنفس				
No stress §	بدون تنفس	119.44a	1565.97a	2.97a	461.88a
Moderate stress	تنفس ملایم	124.33a	816.54b	2.77b	258.53b
Severe stress	تنفس شدید	93.89b	778.19b	2.61c	171.08b

میانگین‌های دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون توکی در سطح معنی‌داری ۵ درصد دارای تفاوت معنی‌دار نمی‌باشند.

Means followed by the same letters in each column are not significant different at the 5% level.

§ No stress, medium stress and severe stress are 100, 75 and 50 percent plant water requirement respectively

حين فتوسنترز اثرات خسارت‌زاي خيلي شدید بر فتوسيستم I و II و نيز کل دستگاه فتوسنترز دارد.¹ يك عامل اكسيدکننده برای دامنه وسیعی از مولکول‌های بیولوژیکی نظیر پروتئین‌ها و رنگدانه‌ها است و می‌تواند از طریق تأثیر بر فتوسيستم II باعث مرگ سلول می‌شود (Choi et al., 2000; Singh et al., 2000; Jaleel et al., 2009) . تولید مولکول‌های فعال اکسیژن باعث کاهش غلظت انواع کلروفیل‌ها و کارتونوئیدها می‌شود (Reddy et al., 2004).

رنگدانه‌های فتوسنترزی برای دریافت نور و ایجاد توان احیای دی‌اکسید کربن در فتوسنترز حائز اهمیت هستند (Jaleel et al., 2009) و تنفس خشکی از طریق تخریب کلروفیل باعث کاهش فتوسنترز و درنتیجه کاهش رشد می‌شود (Kafi et al., 2010; Jaleel et al., 2009). علاوه بر این میزان کلروفیل یا به عبارت دیگر میزان سیمانی برگ گیاه معیاری از سلامت گیاه در شرایط محدودیت مواد غذایی و آب یا سایر تنفس‌های محیطی به حساب می‌آید و صفت بسیار مهمی برای حفظ عملکرد در مرحله پر شدن دانه محسوب می‌گردد (Tuinstra et al., 1997) و محتوای کلروفیل برگ شاخصی از قابلیت فتوسنترزی بافت‌های گیاهی است و کاهش آن باعث کاهش عملکرد شده است (Nageswara et al., 2001; Wright et al., 1994). مطالعات دیگری نیز کاهش کلروفیل a و b، کارتونوئیدها و همچنین کاهش نسبت کلروفیل b به a و

از نتایج این تحقیق چنین استنباط می‌شود که طول ساقه ارزن تحت تأثیر تنفس خشکی کاهش یافت. تنفس خشکی از طریق کاهش طول میانگره باعث کاهش ارتفاع ساقه شد و بر تعداد گره تأثیری معنی‌داری نداشت. کاهش طول ساقه در پاسخ به تنفس خشکی ممکن است به علت تقسیم سلولی و یا طویل شدن سلول باشد. کمبود آب منجر به کاهش اتساع سلول، حجم سلول و درنتیجه رشد سلول می‌شود. علاوه بر این تنفس خشکی از طریق کاهش سرعت انتقال مواد در آوندهای چوبی و آبکش نیز ممکن است باعث کاهش رشد ساقه شود (Boyer, 1988; Lovislo and Schuber, 1998). نتایج مشابهی بوسیله دیگر محققین نیز به دست آمد (Seghatoleslam et al., 2008; Khazaei et al., 2004; Davoodi et al., 2000). کاهش طول ساقه قادر است از طریق مکانیسم‌های تخفیف تنفس خشکی و کاهش تلفات آب، گیاه را در برابر خسارت تنفس را محافظت کند (Mohammadi and Haghparast, 2011).

تحت تأثیر تنفس میزان رنگدانه‌های فتوسنترزی نیز کاهش یافت. با طولانی شدن مدت دام تنفس نیز در همه سطوح تیماری میزان رنگدانه‌ها کاهش بیشتری نشان داد. بروز تنفس در گیاهان حساس از طریق اختلال در انرژی فرآیند فتوسنتر منجر به تشکیل حالت تریپلت کلروفیل (Chl3) می‌شود که از طریق واکنش با O₂³ منجر به تولید O₂¹ فعال گردد. ملاحظه شده است که تشکیل O₂¹ در

در ثبات و پایداری غشاء و نیز تنظیم بیان ژن و به عنوان یک مولکول سیگنالی ایفای نقش می‌کند (Gibson et al., 2005). اثبات شده است که محتوی قندهای محلول نسبت به پرولین می‌تواند یک مارکر بهتر برای انتخاب بهبود مقاومت به خشکی در گندم دوروم باشد (Al Hakimi et al., 1995). گزارش‌های زیادی از تجمع کربوهیدرات‌ها در حین انواع تنش‌های غیرزنده در غلات و گراس‌های معتدل در حین نمو زایشی وجود دارد (Ajithkumarand and Panneerselvam, 2013; MohammadKhani and Heidari, 2008).

افزایش شدت تنش باعث کاهش طول پانیکول و نیز تعداد پانیکول در واحد سطح شد. کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش می‌تواند به علت کاهش تعداد پانیکول در متربمع، کاهش طول پانیکول و یا هر دو باشد. مطالعات زیادی ارتباط بین تعداد پانیکول در متربمع و طول پانیکول با عملکرد دانه را نشان دادند (Shooshi and Mehrani, 2011; Andualem and Tadesse, 2011; Channappagoudar et al., 2008). در سورگم نیز تعداد پانیکول در متربمع نقش مهمی در دستیابی به عملکرد دانه بالا از طریق تأثیر بر تعداد دانه در متربمع دارد Van oosterom and Hammer, 2008). طول پانیکول نیز صفتی وابسته به ژنتیک بوده و سهم عمده‌ای در عملکرد نهایی و تعداد دانه در پانیکول دارد (Abbad et al., 2004).

تعداد دانه در پانیکول و وزن هزار دانه نیز تحت تأثیر تنش کاهش یافت. تغییر در هر یک از اجزای عملکرد می‌تواند باعث کاهش عملکرد شود. شرایط محیطی در زمان توسعه و تشکیل هر جزء از اجزاء عملکرد بر سهم آن جزء تأثیر می‌گذارد و کاهشی که در یک جزء به علت شرایط نامطلوب محیطی به وجود می‌آید می‌تواند پس از رفع شرایط تنش به وسیله سایر اجزاء جبران شود (Mattews et al., 1990)؛ اما این جبران کامل نیست و به ژنتیک و شدت و مرحله تنش بستگی دارد.

کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش می‌تواند به علت کمبود آب کافی در و یا بعد از دوره گلدهی باشد که نه تنها منجر به کاهش سرعت فتوسنتز می‌شود بلکه زمان انتقال کربوهیدرات‌ها به دانه را کاهش می‌دهد (Zhang and Oweis, 1998; Maqsood and Azam, 2007) و نهایتاً منجر به کاهش اندازه دانه و درنتیجه کاهش عملکرد دانه

کارتینوئیدها را در اثر تنش خشکی نشان دادند (Farooq et al., 2009; Ajithkumar and Panneerselvam, 2013; Hui-Ping et al., 2012; Ashraf et al., 1998) نسبت کلروفیل a به کلروفیل b در مقایسه با شاهد نیز می‌تواند به علت خسارت بیشتر کلروفیل b نسبت به کلروفیل a و یا تبدیل کلروفیل b به کلروفیل a در حین تنش باشد (Fang et al., 1998).

تحت تأثیر تنش میزان پرولین بافت برگ افزایش یافت. با افزایش مدت دوام تنش نیز میزان پرولین در تمام تیمارهای آزمایشی افزایش نشان داد. تجمع پرولین پاسخ تعداد زیادی از گیاهان به تنش‌های محیطی نظری کاهش پتانسیل آب است و یک نقش کلیدی به عنوان یک اسمولیت دارد. افزایش پرولین از طریق تنظیم اسمزی به حفظ تورژسانس سلول بهمنظور بقاء و یا کمک به رشد گیاه تحت شرایط تنش خشکی شدید در ارزن کمک می‌کند (Shao et al., 2008). پرولین خصوصاً به علت خصوصیات هیدرولیکی بالا می‌تواند به عنوان یک محلول سازگار ایفای نقش نماید و قادر است در غلظت‌های بالا در سیتوپلاسم سلول بدون دخالت در ساختار و متابولیسم سلول تجمع پیدا کند. وقتی تنش آب افزایش می‌یابد پتانسیل اسمزی از طریق تجمع این محلول‌های سازگار در سیتوپلاسم افزایش می‌یابد. اگرچه پرولین به عنوان اسمولیت سازگار در نظر گرفته می‌شود کارکرد چندگانه آن به عنوان آنتی‌اسیدان و سیگنالینگ در سازگاری به تنش سودمند است. در گیاهان، عمدتاً پرولین از گلوتامات سنتز می‌شود که از طریق آنزیم پرولین ۵ کربوکسیلات سنتتاز (P5CS) به گلوتامات سمی آلدید (GSA) احیا می‌شود و فوراً به پرولین ۵ کربوکسیلات (P5C) تبدیل می‌شود (Kariola et al., 2005). افزایش میزان پرولین در شرایط تنش خشکی می‌تواند به علت افزایش این آنزیم باشد. افزایش محتوی پرولین در ارزن، گندم و دیگر گیاهان بعد از تنش آب به وسیله محققین مختلف گزارش شده است (Ajithkumarand and Panneerselvam, 2013; Tatar and Grverk, 2008; Choudhary, 2005).

با افزایش شدت تنش و همچنین افزایش مدت دوام تنش محتوی قندهای محلول در همه تیمارها افزایش یافت. افزایش قندهای محلول در قسمت‌های مختلف گیاه نیز در حفاظت سلول در برابر تنش نقش دارد. قندهای محلول نه تنها در سنتز دیگر ترکیبات و تولید انرژی نقش دارد بلکه

تأثیر قرار می‌دهد. کاهش عملکرد ارزن تحت تنفس رطوبتی می‌تواند هم به علت کاهش کل ماده خشک تولیدی به‌واسطه کاهش سرعت فتوستنتز و هم ناشی از تغییر در سهم عملکرد دانه باشد. کاهش سرعت فتوستنتز در شرایط تنفس به علت واکنش بسته شدن روزنہ صورت می‌گیرد که یکی از مکانیسم‌های مقاومت به علت کاهش میزان آب در سلول است. افزایش طول ریشه تحت تنفس خشکی به‌واسطه نفوذ عمقی در جستجوی آب و اجتناب از تنفس و نیز سنتز پروولین و هیدرات‌کربن منجر به کاهش سهم عملکرد دانه از آسیمیلات‌های فتوستنتزی می‌شود.

می‌شود. محققین دیگر نیز کاهش وزن دانه را یکی از دلایل Davoodi et al., (2013; Mahalakshmi and Bidinger, 1985 سه هفته بعد از گردهافشانی وزن هزار دانه را به علت کاهش فتوستنتز و نیز کاهش انتقال مواد فتوستنتزی کاهش داد. تنفس در مراحل پنجه‌دهی، ساقه‌دهی، خوش‌دهی، گلدهی و مراحل نمو دانه منجر به کاهش سرعت رشد از طریق کاهش در کارایی مصرف نور می‌شود (Ashraf., 1998) در مراحل مختلف رشد اندام‌های گیاهی برای دریافت آسیمیلات‌ها باهم رقبت می‌کنند. تنش‌های محیطی تخصیص مواد فتوستنتزی بین اندام‌های مختلف را نیز تحت

منابع

- Abbad, H., Jafari, E.L., Bort, S.A., Araus, J.L., 2004. Comparative relationship of the flag leaf and the ear photosynthesis with the biomass and grain yield of durum wheat under a range of water conditions and different genotypes. *Agronomy*. 24, 19-28.
- Ajithkumarand, P., Panneerselvam, R., 2013. Osmolyte accumulation, photosynthetic pigment and growth of setaria italica under droght stress. *Asian Pacific Journal*. 2, 220-224.
- Alizadeh, O., Majidi, I., Nadian, H., Nour-Mohammadi, G., Amerian, M., 2007. Effect of water stress and nitrogen rate of yield and component of Maize. *Journal of Agriculture Science Islamic Azad University*. 13, 427-434. [In Persian with English summary].
- Andualem, W., Tadesse, D., 2011. Correlation and path coefficient analyses of some yield related traits in finger millet germplasms in northwest Ethiopia. *African Journal of Agricultural Research*. 6(22), 5099-5105
- Anjum, F., Yaseen, M., Rasul, E., Wahid, A., Anjum, S., 2003. Water stress in barley, effect on chemical composition ond chlorophyll content. *Pakistan Journal of Agriculture Science*. 40, 45-49
- Akram, M., 2011. Growth and yield component of wheat under water stress of different growth stages. *Bangladesh Journal of Agriculture Resource*. 36, 455-468.
- Ashraf, M., 2007. Role of glycine betain and protein in improving plant abiotic stress resistance. *Environmental and Experimental Botany*. 59, 206-216
- Bukhat, N.M., 2005. Studies in yield and yield associated traits of wheat genotype under drought conditions. M.Sc Thesis department Agronomy. Sindh Agriculture University, Tandojam. Pakistan
- Bates, L.S., Waldron, R.P., Teare, I.D., 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies. *Plant and Soil*. 39, 205-208.
- Boyer, JS., 1988. Cell enlargement and growth induced water potential. *Physiologia Plantarum*. 73(2), 311-316
- Channappagoudar, B.B., Hiremath, S.M., Biradar, N.R., Koti, R.V., Bharamagoudar, T.D., 2008. Physiological basic of yield variation in foxtail millet. *Karnataka Journal of Agriculture Science*. 20, 481-486.
- Choi, WY, Kang, SY, Park, HM, Kim, SS, Lee, KS, Shin, HT., 2000. Effect of water stress by PEG on growth and physiological traits in rice seedling. *Korean Journal of Crop Science*. 45, 112-117.
- Choudhary, NL., 2005. Expression of delta-pyrrolidine-5-carboxylate synthetase gen during drought in rice. *India Biochemistry and Biophysics*. 42, 366-370.
- Davoodi, N., Seghateslami, M.J., moosavi, S.GH., Azari Nasrabad, A., 2013. The effect of foliarapplication of nano-zinc oxide on yileld and water use efficiency in Foxtall Millet in drought stress conditions.

- Environmetal Stresses in Crop Sciences. 6, 37-46. [In Persian with English summary].
- Dencic, S., Kastori, R., Kobilgsky, B., Duggan, B., 2000. Evaluation of grain yield and its component in wheat cultivar and land races under near optimal and drought conditions. *Euphytica*. 113(1), 43-52
- Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D., Basra, S.A.M., 2009. Plant drought stress: effects, mechanisms and management. *Agronomy and Sustainable Development*. 29, 185-212.
- Fang, Z., Boukamp, J.C., Solomos, T., 1998. Chlorophyll activities and chlorophyll degradation durinf leaf senescence in on yellowing mutant and wild type of *Phaseolus vulgaris*. *Journal of Experimental Botany*. 49, 503-510
- Gupta, N.K., Gupta S., Kumar, A., 2001. Effect of water stress on physiological attributes and their relationship with growth and yield in wheat cultivar at different growth stages. *Journal of Agronomy*. 86, 1437-1439
- Heidari zooleh, H., Jahansooz, M.R., Yunusa, I., Hosseini, S.M.B., Chaichi, M.R., Jafari, A.A., 2011. Effect of alternate irrigation on root-divided Foxtail Millet. *Australian Journal of Science*. 5, 205-213.
- Hui-Ping, D., Chan-juan, Sh., An-Zhi, W., Tuxi, Y., 2012. Leaf senescence and photosynthesis in foxtail (*Setaria italica* L.) varieties exposed to drought conditions. *Australian Journal of Crop Science*. 6(2), 232-237.
- Jaleel, C., Manivannan, P., Wahid, A., Farooq, M., Somasundaram, R., 2009. Drought stress in plant: A review on morphological characteristics and pigments composition. *International Journal of Agriculture and Biology*. 11, 100-105
- Kafi, M., Borzoee, A., Salehi, M., Kamandi, A., Masoumi, A., Nabati, J., 2010. Physiology of Environmental Stresses in Plants. Ferdowsi University of Mashhad publication. 502p.[In Persian].
- Kariola, T., Brader, G., Li, J., Palva, E.T., 2005. A damage control enzyme, effects the balance between defense pathway in plant. *The Plant Cell*. 17, 282-294.
- Khazanedari, L., Zabol Abbasi, F., Ghandhari, Sh., Kouhi, M., Malbousi, Sh., 2009. Drouhjt prediction in Iran next 30 years. EMS Annual Meeting Abstract, Vol 6.
- Keshavars, L., Farahbakhsh, H., Golkar, P., 2012. Effects of drought stress and absorbent polymer on morph-physiological traits of Pear Millet. *International Research Journal of Applied and Basic Science*. 3, 148-154.
- Keshavars, L., Farahbakhsh, H., Golkar, P., 2013. Effects of different irrigation and superabsorbent levels on physiomorphological traits and forage yield of Millet. *American-Eurasian Journal of Agriculture and Environment Science*. 13, 1012-1018.
- Khazaei, H.R., Mohammad abadi, A.A., Borzooei, A., 2002. The effect of drought stress on morphological and physiological characteristics of millets. *Iranian Journal of Field Crop Research*. 3(1), 35-44. [In Persian with English summary].
- Lata, C., Sarita, J.H., Prasad, M., Sreenivasulu, N., 2011. Differential antioxidative responses to dehydration-induced oxidative stress in core set of foxtail millet cultivars. *Protoplasma*. 248, 817-828
- Liu, H.P., Dong, B.H., Zhang, Y.Y., Liu, Z.P., and Liu, Y.L., 2004. Relationship between osmotic stress and the levels of free, conjugated and bound polyamines in leaves of wheat seedlings. *Plant Science*, 166, 1261-1267.
- Lovisolo, C., Schuber, NK., 1998. Effect of water stress on vessel size xylem hydrolic conductivity in vicia. *Journal of Experimental Botany*. 1998, 693-700
- Mahalakshmi, V., Bidinger, F.R., 1985. Flowering response of pearl millet to water stress during panicle development. *Annals of Applied Biology*. 106, 571-578
- Maqsood, M., Azam Ali, S.M., 2007. Effect of environment stress on growth radiation use effivency and yield of finger millet. *Pakistan Journal of Botany*. 39, 463-474.
- Mark, T., Antony, B., 2005. Abiotics stress tolerance in grasses from model plants to crop plants. *Plant Physiology*. 137, 791-793.
- Matthews, K.B., Reddy, D.M., Ranj., Peacock, J.K., 1990. Response of four Sorghum lines to mid-season drought. I. Growth, water use and yield. *Field Crop Research*. 25, 279-296.
- Mohamad khani, N., Heidari, R., 2008. Drought-induced accumulation of soluble sugars and

- prolin in two maize varieties. World Applied Sciences Journal. 3, 448-453.
- Mohammadi, R., Haghparast, R., 2011. Evaluation of rainfed promising wheat breeding lines on farmers field in west of Iran. International Journal of Plant Breeding. 5, 30-36
- Moosavi, Gh., Mirhadi, M., Saadat, A., 2011. Effect of deficit-irrigation and nitrogen levels on yield and water use efficiency of sorghum and pearl millet (*Pennisetum*). Journal of Modern Science. 5, 101-114.
- Nageswara, R.R.C., Talwar, H.S., Wright, G.C., 2001. Rapid assessment of specific leaf area and leaf nitrogen in peanut (*Arachis hypogaea* L.) using chlorophyll meter. Journal of Agronomy and Crop Science, 186(3), 175-182.
- Nakhaei, A., Arazmjo,E., Abbasi, M.R., 2011. Determination of terminal drought tolerant accessions in millet by drought tolerance indices. Environmental Stresses in Crop Sciences.5, 115-124. [In Persian with English summary].
- Osborn, C.P., Frekleton, R.P., 2009. Ecological selection pressures for C4 photosynthesis in the grasses. Proceedings of Royal Society Botany. 276, 1753-1760.
- Panneer selvam, M., 2009. Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigments composition. International Journal of Agricultural Biology. 11, 100-105.
- Razmjoo, K., Heidarizadeh, P., Sabzalian, M.R., 2008. Effect of salinity and drought stresses on growth parameter and essential oil content of Matricaria chamomile. Journal of Agriculture and Biology. 10, 451-454.
- Reddy, A. R., Ramachandra, R. K., Chaitanya, V., Vivekanandan, M., 2004. Drought induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants. Journal of Plant Physiology. 161, 1189-1202.
- Sairam,R.K., Saxena, D.C., 2000. Oxidative stress and antioxidant in wheat genotypes: possible mechanism of water stress tolerance. Journal of Agronomy and Crop Science, 184, 55-61.
- Santhakamar, G., 1999. Correlation and path analysis in Foxtail Millet. Journal of Maharashtra Agriculture University. 24.
- Schlegel, H.G., 1956. Die Verwertung organischer sauren durch chlorella in licht. Plant. 47, 510-515.
- Seghatoleslami, M.J., Kafi, M., Majidi, E., 2008. Effect of deficit irrigation of yield, WUE and some morphological and physiological traits of three millet species. Pakistan Journal of Botany. 40, 1555-1560.
- Shooshi Dezfooli, A., Mehrani, A., 2011. Investigation of correlation between yield and component yield in Foxtail Millet species. Journal of Agronomy Science.41, 413-421. [In Persian with English summary].
- Siles, M.M., Ken Russell, W., David, D., Lenis, A., 2004. Heterosis for grain yield and other agronomic traits in Foxtail Millet. Crop Science. 44, 1960-1965.
- Singh, Kp., 2001. Effect of water stress and seed germination and seedling growth of some wheat genotype. Jrusted Journal of Millennium Acta Plant Science. 14, 23-26
- Tatar, O., Gevrek, MN., 2008. Influence of water stress on proline accumulation, lipid peroxidation and water content of wheat. Asian Journal Plant Science. 7, 409-412
- Trovato, M., Mattioli, R., Costantino, P., 2008. Multiple role of prolin in plant stress tolerance and development. Rendiconti Licei 19, 325-346.
- Tuinstra, M.R., Grote, E.M., Goldsbrough, P.B., Ejeta, G., 1997. Genetic analysis of postflowering drought tolerance and components of grain development in *Sorghum bicolor* Moench. Molecular Breeding. 3, 439–448.
- Van osterom, E.J., Hammer, G.L., 2008. Determination of grain number in sorghum. Field Crop Research, 108, 259-268.
- Vitkauskaite, G., Venskaityte, L., 2011. Differences between C3 (*Hordeum vulgare* L.) and C4 (*Panicum miliaceum* L.) plants with respect to their resistance to water deficit. Agriculture. 98(4), 349-356.
- Wright, G.C., Nageswara, R.C., Farquhar, G.D., 1994. Water use efficiency and carbon isotop discrimination in peanut under water deficit conditions. Crop Science, 34, 92-97.
- Xoconstle-Cazares, B., Ramirez-Ortega, F.A., Flores-Lenes, L. and Ruiz-Medrano, R., 2010. Drought tolerance in crop plants.

- American Journal of Plant Physiology, 5, 214–256.
- Zhang, J., Kirkham, M.B., 1995. water relations of water stressed, split-root C4 (*Sorghum binocolor*) and C3 (*Helianthus annus*) plants. American Journal of Botany. 82, 1220-1229.