

تأثیر سطوح مختلف آبیاری و زمان برداشت بر برخی خصوصیات زراعی و میزان اسانس گیاه دارویی زینیان (*Carum copticum L.*)

اسماعیل رضائی چیانه^۱، علیرضا پیرزاده^۲، بهمن حسینی^۳، سید هادی مدنی^۴

۱. استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.
۲. دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.
۳. دانشیار گروه علوم باگبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

تاریخ دریافت: ۹۳/۰۴/۱۱؛ تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۸/۲۶

چکیده

تولید گیاهان دارویی می‌تواند تحت عوامل محیطی متعددی قرار گیرد. به منظور بررسی تأثیر آبیاری و زمان برداشت بر برخی خصوصیات زراعی و میزان اسانس گیاه دارویی زینیان، یک آزمایش به صورت کرت‌های خردشده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ در مزرعه‌ای واقع در استان آذربایجان غربی- شهرستان نقدة اجرا گردید. در این آزمایش پنج تیمار آبیاری بر اساس میزان تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (آبیاری بعد از ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلی‌متر تبخیر) در کرت‌های اصلی و سه زمان برداشت (شیری، خمیری و رسیدگی کامل دانه‌ها) در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که سطوح مختلف تیمارهای آبیاری بر ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، درصد اسانس و عملکرد اسانس تأثیر معنی داری داشته است. افزایش فاصله آبیاری از ۶۰ به ۱۸۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک سبب کاهش معنی دار تمامی صفات مذکور شد. بیشترین عملکرد دانه (۱۰۷۴ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس (۳۹/۹۰ کیلوگرم در هکتار) از تیمار آبیاری پس از ۶۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک حاصل شد. زمان برداشت بر تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، درصد اسانس و عملکرد اسانس تأثیر معنی داری داشت. به طوری که بیشترین عملکرد دانه (۹۳۱ کیلوگرم در هکتار)، درصد اسانس (۴/۳۵) و عملکرد اسانس (۴۰/۱۳) کیلوگرم در هکتار از برداشت در مرحله خمیری به دست آمد. بنابراین، توصیه می‌گردد که برای کسب حداقل تولید اسانس و حصول عملکرد قابل قبول، گیاه زینیان تحت تنش ملایم خشکی قرار گرفته و برداشت گیاه در مرحله خمیری دانه صورت پذیرد.

واژه‌های کلیدی: اجزای عملکرد، تنش خشکی، تولید اسانس، عملکرد دانه، گیاهان دارویی.

مقدمه

لیمونن می‌باشد (Majnoon Hosseini and Davazdah 2007; Khajeh et al., 2004). آب یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های زیست‌محیطی در تولید گیاهان دارویی می‌باشد که در جریان تولید گیاهان می‌تواند خدمات سنگینی بر رشد، نمو و میزان مواد مؤثره دارویی گیاهان وارد نماید؛ بنابراین، تنظیم و مدیریت آب در گیاهان دارویی و معطر از نظر عملکرد اقتصادی و تولید اسانس حائز اهمیت زیادی است

زنیان (*Carum copticum L.*) گیاهی یک‌ساله متعلق به تیره چتریان^۱، به ارتفاع ۳۰ تا ۹۰ سانتی‌متر، برگ‌ها بریده و نخی شکل، گل‌ها با گلبرگ‌های سفید و کوچک و پرچم‌های صورتی‌رنگ است (Majnoon Hosseini and Davazdah 2007). بذر زنیان دارای اسانس حاوی تیمول، ترکیبات سیمین، آلفا پینن، بتاپینن، گاما ترپینن، میرسن و

¹. Apiaceae

(Ghasemi Siani et al., 2011) فواصل آبیاری اثر معنی‌داری بر ارتفاع گیاه، طول سنبله، تعداد سنبله در بوته عملکرد دانه و درصد موسیلاز در گیاه اسفرزه داشت. نتایج مطالعات لاربی و همکاران (Laribi et al., 2009) در گیاه زیره سیاه، آقایی و احسان زاده (Agaei and Ehsanzadeh, 2011) در گیاه کدوی تخم کاغذی، رضاپور و همکاران (Rezapor et al., 2011) در سیاهدانه، ربی و همکاران (Rebey et al., 2012) در زیره سبز و موسوی نیک (Mosavi-Nik, 2012) در اسفرزه نیز مؤید این است که تنش خشکی سبب کاهش اجزای عملکرد و عملکرد دانه گیاهان فوق گردیده است.

از آنجایی که میزان انسانس و اجزای آن در طول دوره نمو دانه‌ها در حال تغییر است و از طرفی میزان آب قابل دسترس می‌تواند عملکرد دانه و تولید انسانس را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین شناخت مرحله‌ای از رسیدگی بذر که از بالاترین عملکرد دانه و انسانس برخوردار باشد، می‌تواند بسیار مهم تلقی شود. از طرفی، شناسایی گونه‌های مقاوم و نیمه مقاوم به خشکی با انجام آزمایش‌های مربوطه برای حصول آستانه‌های اقتصادی عملکرد گیاهان زراعی و دارویی مهم به نظر می‌رسد. از آنجایی که در رابطه با پاسخ‌های گیاه دارویی زنیان در طول دوره رسیدگی دانه به کمبود آب اجرا گردید تا ضمن تعیین سطح آبیاری مطلوب، تأثیر تیمارهای متفاوت آبیاری و زمان برداشت بر خصوصیات زراعی و تغییرات کمی انسانس در دانه زنیان تعیین گردد.

مواد و روش‌ها

آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ در مزرعه‌ای واقع در استان آذربایجان غربی- شهرستان نقده با طول جغرافیایی $۴۵^{\circ} ۲۴' \text{ و عرض جغرافیایی } ۳۶^{\circ} ۵۷'$ و ارتفاع ۱۳۲۸ متر از سطح آب‌های آزاد اجرا شد. میانگین‌های متوسط دما و بارندگی سالیانه در طی یک دوره ده‌ساله به ترتیب برابر $۱۲/۴۰$ درجه سانتی‌گراد و ۳۲۳ میلی‌متر گزارش شده است. بافت خاک مزرعه از نوع رس-سیلیتی است. آزمایش به صورت کرت‌های خردشده بر پایه بلوك‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش پنج تیمار آبیاری بر اساس میزان تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (آبیاری بعد از ۹۰ ، ۱۲۰ ، ۱۵۰ و ۱۸۰ میلی‌متر تبخیر) در کرت‌های

چراکه گیاهان بسته به گونه گیاهی به تنش خشکی واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند (Omidbaigi, 2009). نتایج تحقیقات حاکی از آن است که گیاهان هنگام مواجهه شدن با تنش‌های محیطی اغلب از رشد کمتری برخوردار هستند، چراکه در این شرایط مواد پرورده موجود را برای افزایش سنتز متابولیت‌های ثانویه (ترکیبات ترپنی) اختصاص می‌دهند تا بقای خود را در شرایط سخت محیطی تضمین نمایند (Rezaei-Chiyaneh, 2011; Bettaieb et al., 2009; Rebey, 2012).

حیدری و همکاران (Heidari et al., 2012) طی تحقیقی در گیاه آنیسون دریافتند که عملکرد دانه و عملکرد انسانس تحت تأثیر تنش خشکی به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. همچنین آنان گزارش کردند که در بین زمان‌های برداشت (مرحله خمیری سفت و رسیدگی کامل گیاه)، برداشت در مرحله رسیدگی کامل بیشترین درصد انسانس دانه ($۳/۸۶$) را نسبت به مرحله خمیری سفت ($۳/۴۰$) دارد. رسیدگی چیانه (Rezaei-Chiyaneh, 2011) در بررسی اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر تجمع انسانس، ترکیبات آن و برخی صفات اکوفیزیولوژیکی در رازیانه گزارش کرد که درصد انسانس با رسیدگی دانه‌ها کاهش، اما تنش خشکی باعث افزایش تولید انسانس دانه شد. همچنین، با کاهش مقدار آب آبیاری، تعداد چتر در گیاه، تعداد دانه در هر چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد انسانس در گیاه رازیانه به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. مددی بناب (Madadi-Bonab, 2011) با بررسی روند تغییرات انسانس شوید در سه مرحله (شیری، مومی و رسیدگی کامل دانه‌ها) نشان داد که دانه‌ها در مرحله شیری بیشترین درصد و عملکرد انسانس را داشته‌اند و با گذشت زمان از درصد و عملکرد انسانس کاسته می‌شود. جمشیدی و همکاران (Jamshidi et al., 2012) در تحقیقات خود اعلام کردند که اگرچه تنش کم‌آبی باعث افزایش درصد انسانس دانه رازیانه شد، اما با این حال در اثر تنش کم‌آبی عملکرد دانه و عملکرد انسانس بهشت کاهش یافت. علیزاده و همکاران (Alizadeh et al., 2006) با بررسی اثر رژیم‌های آبیاری بر زیره سبز ملاحظه کردند که تیمارهای مختلف آبیاری تأثیری بر عملکرد دانه، تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر از نظر آماری نداشت؛ اما تیمار آبیاری کامل کمترین وزن هزار دانه، کمترین شاخص برداشت و بیشترین بیومس کل را داشت. بر طبق مطالعه قاسمی سیانی و همکاران

به دست آمده از نرم افزار 16 SPSS و مقایسه میانگین های به دست آمده آماری توسط روش آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ارتفاع بوته به طور معنی داری ($p \leq 0.01$) تحت تأثیر تیمارهای آبیاری قرار گرفت، اما زمان برداشت و اثر متقابل آنها تأثیر معنی داری بر ارتفاع بوته در گیاه نداشت (نتایج مربوط به تجزیه واریانس نشان داده نشده است). بیشترین ارتفاع بوته در تیمار آبیاری ۶۰ میلی متر تبخیر از تشک به میزان ۹۷/۶۷ سانتی متر و کمترین ارتفاع بوته در تیمار آبیاری پس از ۱۸۰ میلی متر تبخیر از تشک به میزان ۶۸/۵۶ سانتی متر حاصل شد. از نظر آماری اختلاف معنی داری بین تیمارهای ۶۰ و ۹۰ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر مشاهده نشد (جدول ۱).

کاهش ارتفاع بوته با افزایش سطوح آبیاری را می توان به اختلال در فتوستنتر به علت کمبود رطوبت خاک و کاهش تولید مواد فتوستنتزی برای ارائه به بخش های در حال رشد گیاه و نهایتاً عدم دستیابی گیاه به پتانسیل ژنتیکی از نظر ارتفاع نسبت داد. امید بیگی و محمودی سورستانی (Omidbaigi and Mahmoodi Sourestani, 2010) در تحقیقی بر روی گل مکزیکی عنوان کردند که علت کاهش ارتفاع، کاهش فشار تورژسانس و متعاقب آن کاهش رشد، تقسیم و بزرگ شدن سلولی در شرایط تنفس خشکی می باشد. بتایب و همکاران (Bettaieb et al., 2009) در مریم‌گلی، رضاپور و همکاران (Rezapor et al., 2011) در سیاه‌دانه و قاسمی سیانی و همکاران (Ghasemi Siani et al., 2006) در اسفرزه نیز نشان دادند که با افزایش سطوح تنفس خشکی ارتفاع بوته به طور معنی داری کاهش یافت که با نتیجه آزمایش حاضر مطابقت دارد.

تیمارهای آبیاری و زمان برداشت تأثیر معنی داری ($p \leq 0.01$) بر تعداد چتر در بوته داشت. تیمار آبیاری پس از ۶۰ میلی متر تبخیر از تشک با ۴۰/۸۹ چتر و تیمار آبیاری پس از ۱۸۰ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر با ۲۶/۸۹ چتر به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد چتر در بوته را به خود اختصاص دادند، بنابراین، تعداد چتر در بوته با افزایش فاصله دور آبیاری و رسیدن به ۱۸۰ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر در حدود ۳۵ درصد کاهش یافت. از نظر آماری بین تیمارهای ۶۰ با ۹۰ و ۱۲۰ با ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشک

اصلی و سه زمان برداشت (شیری، خمیری و رسیدگی کامل دانه ها) در کرت های فرعی قرار گرفتند. پس از عملیات آماده سازی زمین (شخم، دیسک و تسطیح)، بذور در عمق سه سانتی متر زیر سطح خاک به صورت کرتی، در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۰ کشت شدند. بعد از استقرار کامل بوته ها، تیمارهای آبیاری اعمال گردید. علف های هرز در طول فصل رشد بنا به ضرورت از طریق وجین دستی کنترل شدند. بر اساس آزمون خاک، کود سوپرفسفات تریپل به میزان ۱۵۰ کیلوگرم تمامًا قبل از کاشت و کود اوره به میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار به صورت سرک (در دو مرحله قبل از کاشت و مرحله ساقه رفتن) به کرت های آزمایش اضافه شد. به علت بالا بودن مقدار پتابسیم قابل جذب، از کود پتابسیم استفاده نشد.

هر واحد آزمایشی شامل هشت ردیف کاشت به طول چهار متر، با فاصله بین ردیف ۴۰ سانتی متر و روی ردیف ۲۵ سانتی متر در نظر گرفته شد. همچنین به منظور جلوگیری از نشت آب به کرت های مجاور، فاصله هر کرت اصلی ۱/۵ متر و فاصله بین دو بلوک سه متر در نظر گرفته شد. به منظور اندازه گیری عملکرد و اجزاء عملکرد با توجه به زمان برداشت، از کرت های مربوط در سه زمان رسیدگی دانه ها (شیری، خمیری و رسیدگی کامل دانه ها) پس از حذف حاشیه ها در هر واحد آزمایشی، نیم متر از ابتدا و انتهای کرت ها و همچنین ردیف های کناری، از مساحتی در حدود ۷/۲ مترمربع نمونه برداری انجام گرفت. برای تعیین اجزاء عملکرد دانه ۱۰ بوته به طور تصادفی انتخاب و تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر شمارش شدند. وزن هزار دانه با توزین ۴ نمونه ۱۰۰۰ تایی از هر واحد آزمایشی اندازه گیری شد. اندازه گیری عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی با حذف اثر حاشیه از هر طرف واحد آزمایشی انجام گرفت. برای تعیین عملکرد بیولوژیکی، پس از جدا نمودن بذور زنیان، اندام های هوایی در دمای اتاق و در سایه خشک شدن و سپس وزن شدند. شاخص برداشت از تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیکی $\times 100$ محاسبه شد. به منظور استخراج اسانس، ۳۰ گرم نمونه بذری از هر کرت وزن گردید و پس از آسیاب شدن مختصر در ۳۰۰ میلی لیتر آب مقطار در داخل دستگاه کلونجر به مدت سه ساعت جوشانده شد تا اسانس آن استخراج شود. پس از تعیین درصد اسانس، عملکرد اسانس بر اساس عملکرد دانه \times درصد اسانس محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های

تأثیر تیمارهای آبیاری بر تعداد دانه در چتر در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار ($p \leq 0.01$) بود، اما زمان برداشت بر روی این صفت معنی‌دار نبود. بالاترین تعداد دانه در چتر (۱۵۰ عدد) از تیمار آبیاری پس از ۶۰ میلی‌متر تبخیر از تشک تبخیر و کمترین آن از تیمار آبیاری پس از ۱۸۰ میلی‌متر تبخیر از تشک تبخیر (۹۳ عدد) به دست آمد. از لحاظ آماری بین تیمارهای ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ میلی‌متر تبخیر از تشک تبخیر اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (جدول ۱).

تبخیر اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (جدول ۱). در بین زمان‌های برداشت، برداشت در مرحله رسیدگی کامل دانه‌ها بیشترین تعداد چتر در بوته (۳۶/۹۳ عدد) و مرحله شیری کمترین تعداد چتر در بوته (۳۱ عدد) را دارد. از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بین زمان رسیدگی کامل دانه‌ها و مرحله خمیری وجود نداشت (جدول ۲). از آنجایی که زنجیر یک گیاه رشد نامحدود است تا آخر دوره رسیدگی رشد زایشی آن و بالطبع تولید چتر ادامه دارد.

جدول ۱. مقایسه میانگین‌های صفات مورد مطالعه تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری در گیاه زنجیر

Table 1. Mean comparison of study traits affected by different levels of irrigation in the plant *Carum copticum L.*

آبیاری سطح (میلی‌متر تبخیر از تشک تبخیر) Irrigation levels (mm evaporation from evaporation pan)	Plant height (cm)	Umbels per plant	Seeds per Umbels	1000 seed weight (g)	Seeds yield (kg.ha ⁻¹)	Biological yield (kg.ha ⁻¹)	Essential oil percentage	Essential oil yield (kg.ha ⁻¹)	عملکرد	عملکرد	عملکرد
									دانه	بیولوژیکی	درصد
60	97.67 a	40.89 a	150.88 a	1.60 a	1074.44 a	5105.23 a	3.69 b	39.63a	اسانس	اسانس	اسانس
90	96 a	39.44 a	147.33 a	1.62 a	1023.23 a	5019.66 a	3.53 b	36.12 b	(کیلوگرم در هکتار)	(کیلوگرم در هکتار)	(کیلوگرم در هکتار)
120	86.89 b	34.22 b	142.11 a	1.54 a	812.22 b	4289.40 b	4.63 a	37.60 ab			
150	79 c	32.67 b	115.22 b	1.33 b	764.44 b	4136.11 b	4.93 a	37.68 ab			
180	68.56 d	26.89 c	93.67 c	1.21 b	551.11 c	2781.36 c	2.96 c	16.31 c			

میانگین‌های با حروف متفاوت در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد دارند.
Means with different letters in each column according to Duncan test are significant at the 5% level.

کاهش در اجزای عملکرد گیاه شود، منجر به کاهش عملکرد Koocheki et al., 2011; Laribi Heidari et al., 2009 (et al., 2009) (et al., 2012) در تحقیقی بر روی گیاه آنسیوسون دریافتند که تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چترک با افزایش فاصله دور آبیاری به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. موسوی و همکاران (Mousavi et al., 2011) در همیشهبهار و پالیزدار و همکاران (Palizdar et al., 2013) در گلنگ نیز گزارش کردند که افزایش دور آبیاری از ۶۰ به ۱۸۰ میلی‌متر تبخیر از تشک سبب کاهش تعداد طبق و تعداد دانه در طبق می‌شود.

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که تنش خشکی می‌تواند از طریق کاهش منبع فتوسنتری گیاه و مخزن (اجزای عملکرد) و افت فعالیت آنزیم‌های مؤثر بر این فرآیند بر هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده عملکرد تأثیر داشته باشد و درنهایت منجر به تغییر در عملکرد تولیدی در گیاهان شود Seghatoleslami et al., 2011; Rezaei-Chiyaneh et al., 2012 (et al., 2012). تعداد چتر و تعداد دانه در چتر در حقیقت ظرفیت مخزن را تعیین می‌کند، هر چه تعداد چتر و تعداد دانه بیشتر باشد، گیاه دارای مخازن بزرگ‌تری برای دریافت مواد فتوسنتری تولید شده است و افزایش این صفات منجر به افزایش عملکرد خواهد شد؛ بنابراین، هر عاملی که از طریق نقصان در فراهم شدن نهاده‌های فتوسنتری باعث

تأثیر تیمارهای آبیاری و زمان برداشت بر عملکرد بیولوژیکی از لحاظ آماری معنی دار بود ($p \leq 0.01$). بیشترین عملکرد بیولوژیکی (۵۱۰۵ کیلوگرم در هکتار) از تیمار ۲۷۸۱ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر و کمترین مقدار آن (۲۷۸۱ کیلوگرم در هکتار) از تیمار ۱۸۰ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر به دست آمد؛ یعنی افزایش فاصله آبیاری از ۶۰ میلی متر تبخیر به ۱۸۰ میلی متر سبب کاهش ۴۵ درصدی عملکرد بیولوژیکی گردید (جدول ۱). در بین زمان‌های برداشت، برداشت در مرحله خمیری (۴۶۳۲ کیلوگرم در هکتار) بیشترین عملکرد بیولوژیکی و برداشت در مرحله رسیدگی کامل دانه‌ها (۳۸۶۲ کیلوگرم در هکتار) کمترین عملکرد بیولوژیکی را تولید کردند (جدول ۲).

کمبود آب قابل جذب در گیاه منجر به افزایش انرژی مصرفی گیاه جهت بالا بردن غلظت شیره سلولی و تغییر در مسیرهای تنفسی و فعال شدن مسیر پنتوز سففات، افزایش اختصاص مواد فتوسنترزی به ریشه و درنتیجه کاهش سطح فتوسنترز کننده، بسته شدن روزنه‌ها، کاهش قابلیت تبادل گازی روزنه‌ها، کاهش آبگیری کلروپلاست و سایر بخش‌های پروتوبلاسم، کاهش سنتز پروتئین و کلروفیل که سبب محدود شدن فتوسنترز شده و درنهایت عملکرد نهایی گیاه را کاهش می‌دهد (Bettaieb et al., 2009; Hopkins, 1995; Laribi et al., 2009; Munns, 1993 چیانه و همکاران (Rezaei Chiyanah et al., 2012) در گیاه رازیانه گزارش کردند که با کاهش مقدار آب آبیاری، اجزای عملکرد و نهایتاً عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی به طور معنی داری کاهش یافته است. میر شکاری و فرج وشن (Mirshekari and Farahvash, 2011) در مطالعه دیگر روی گیاه رازیانه نشان دادند که با افزایش سطح آبیاری از ۹۰ میلی متر به ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشک از عملکرد دانه به طور معنی داری کاسته شد. سلطانی Soltani Gerdafaramarzi et al., (2011) در بابونه، رضپور و همکاران (Rezapor et al., 2011) در سیاهدانه، مددی (Madadi-Bonab, 2011) در گردفرامرزی و همکاران (Rezapor et al., 2011) در سیاهدانه، مددی (Madadi-Bonab, 2011) در شوید نیز مشاهده کرد که تنش خشکی سبب کاهش معنی-دار عملکرد گیاهان مذکور شده است.

درصد اسانس دانه زنیان به طور معنی داری ($p \leq 0.01$) تحت تأثیر تیمارهای آبیاری و زمان برداشت قرار گرفت. کمترین درصد اسانس (۲/۹۶ درصد) در دانه‌های حاصل از تیمار آبیاری پس از ۱۸۰ میلی متر تبخیر از تشک

تأثیر تیمارهای آبیاری و زمان برداشت بر وزن هزار دانه معنی دار ($p \leq 0.01$) شد. مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که بیشترین (۱/۶۰ گرم) و کمترین وزن هزار دانه (۱/۲۱ گرم) به ترتیب به تیمارهای ۶۰ و ۱۸۰ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر تعلق داشت. به طوری که مقدار وزن هزار دانه تحت تأثیر تیمار ۱۸۰ نسبت به تیمار ۶۰ میلی متر تبخیر از تشک حدود ۲۴ درصد کاهش نشان داد، اما بین تیمارهای ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر از لحاظ آماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد (جدول ۱). در بین زمان‌های برداشت، برداشت در مرحله خمیری با میانگین ۱/۵۴ گرم بیشترین و مرحله شیری دانه‌ها با میانگین ۱/۳۹ گرم کمترین وزن هزار دانه را دارد (جدول ۳). در شرایط کمبود آب به دلیل کوتاهتر شدن طول دوره رویشی و زایشی (دوره پر شدن دانه‌ها) و اثرات منفی تنش کم‌آبی بر فتوسنترز جاری و کاهش ذخیره مواد فتوسنترزی قبل از مرحله گلدهی در اندام‌های رویشی منجر به کاهش مواد منتقل شده به دانه و درنهایت کاهش وزن هزار دانه می‌شود. کوچکی و همکاران (Koocheki et al., 2011) در اسفزه، سلیمانی و همکاران (Soleymani et al., 2011) در کلزای پاییزه، و آقایی و احسان زاده (Agaei and Ehsanzadeh, 2011) در کدوی تخم کاغذی نیز گزارش کردند که وزن هزار دانه تحت تنش کم خشکی به طور معنی داری کاهش می‌یابد.

تیمارهای آبیاری و زمان برداشت اثر معنی داری ($p \leq 0.01$) بر عملکرد دانه نشان دادند. بیشترین میزان عملکرد دانه (۱۰۷۴ کیلوگرم در هکتار) در تیمار ۶۰ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر و کمترین آن (۵۵۱ کیلوگرم در هکتار) در تیمار ۱۸۰ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر به دست آمد. با افزایش فاصله آبیاری از ۶۰ به ۱۸۰ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر حدود ۴۸ درصد تولید عملکرد دانه کاهش یافت. بین تیمارهای ۶۰ و ۹۰ و تیمارهای ۱۲۰ با ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشک تبخیر از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت (جدول ۱). در بین زمان‌های برداشت، برداشت در مرحله خمیری (۹۳۱ کیلوگرم در هکتار) بیشترین عملکرد دانه و برداشت در مرحله رسیدگی کامل دانه‌ها (۷۹۰ کیلوگرم در هکتار) کمترین عملکرد دانه را تولید کردند. از نظر آماری اختلاف معنی داری بین زمان برداشت در مرحله رسیدگی کامل با مرحله شیری دانه‌ها وجود نداشت (جدول ۲).

۳۹/۶۳) ($p \leq 0.01$) را نشان دادند. بیشترین عملکرد اسانس (۳۹/۶۳ کیلوگرم در هکتار) از تیمار آبیاری پس از ۶۰ و کمترین مقدار آن (۱۶/۳۱ کیلوگرم در هکتار) از تیمار آبیاری پس از ۱۸۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک حاصل شد. بین تیمارهای آبیاری پس از ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک از نظر عملکرد اسانس اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (جدول ۱). در بین زمان‌های برداشت، برداشت در مرحله خمیری (۴۰/۱۳ کیلوگرم در هکتار) بیشترین عملکرد اسانس و برداشت در مرحله شیری دانه‌ها (۲۹/۱۶ کیلوگرم در هکتار) کمترین عملکرد اسانس را تولید کردند (جدول ۱).

بیشترین مقدار آن (۴/۹۳ درصد) در تیمار آبیاری پس از ۱۵۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک به دست آمد. با افزایش فاصله آبیاری از ۶۰ میلی‌متر به ۱۵۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک، درصد اسانس افزایش و در فواصل زیادتر آبیاری آبیاری پس از ۱۸۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک) به طور معنی‌داری کاهش پیدا کرد (جدول ۱). در بین زمان‌های برداشت، برداشت در مرحله خمیری دانه بیشترین درصد اسانس دانه (۴/۳۵ درصد) را نسبت به مراحل شیری (۳/۵۹ درصد) و رسیدگی کامل دانه‌ها (۳/۵۹ درصد) تولید کرد (جدول ۲).

تیمارهای آبیاری و زمان برداشت از نظر عملکرد اسانس اختلاف معنی‌داری را در سطح احتمال یک درصد

جدول ۲. مقایسه میانگین‌های صفات مورد مطالعه تحت تأثیر زمان برداشت در گیاه زنیان

Table 2. Mean comparison of study traits affected by harvesting time in the plant *Carum copticum L.*

عملکرد اسانس (کیلوگرم در هکتار)	درصد اسانس	عملکرد بیولوژیکی (کیلوگرم در هکتار)	عملکرد بیولوژیکی (کیلوگرم در هکتار)	وزن هزار دانه (گرم)	تعداد چتر در بوته	زمان برداشت	Harvesting time
29.16 b	3.59 b	4303.50 a	813.33 b	1.39 b	31 b	شیری Milky	
40.13 a	4.35 a	4632.62 a	931 a	1.54 a	36.47 a	خمیری Pasty	
31 b	3.91 b	3862.96 b	790.67 b	1.47 ab	36.93 a	رسیدگی کامل Full ripening	

میانگین‌های با حروف متفاوت در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد دارند.
Means with different letters in each column according to Duncan test are significant at the 5% level

که بتواند پتانسیل آب سلولی را کاهش دهد. این ترکیبات برای گیاه هزینه‌بر بوده و گیاه این هزینه را از کاهش عملکرد کل یا دانه جبران می‌کند (Munns, 1993). Rezapor et al., 2011) در سیاه‌دانه، رضابور و همکاران (Rezaei Chiyaneh et al., 2012) در رضائی چیانه (Rezaei Chiyaneh et al., 2012) در رازیانه، آیسو و همکاران (Eiasu et al., 2009) در گیاه شمعدانی معطر گزارش کردند که با افزایش شدت تنش درصد اسانس به طور معنی‌دار افزایش یافته است. ربی و همکاران (Rebey et al., 2012) در مطالعه اثر تنش خشکی (بدون تنش، تنش متوسط و تنش شدید) بر روی زیره سبز نشان دادند که گیاهان تحت تنش متوسط نسبت

نتیجه تحقیقات مختلف عموماً نشان داده که تشکیل و تجمع اسانس در شرایط کم‌آبی عموماً افزایش می‌یابد و این افزایش اسانس را تحت شرایط تنش خشکی نتیجه نوعی مکانیسم دفاعی و سازگاری بیوشیمیایی به شرایط محیطی Omidbaigi, 2009; Petropoulos et al., 2008)؛ اما نکته‌ای که باید مورداشاره قرار گیرد این است که همیشه همراه با بالا رفتن میزان تنش، درصد اسانس نمی‌تواند افزایش یابد. چراکه در تنش‌های بسیار شدید گیاه بیشتر مواد فتوسنتری خود را صرف تولید ترکیبات تنظیم‌کننده‌های اسمزی از جمله پرولین، گلابیسین-بتائین و ترکیبات قندی همانند ساکارز، فروکتوز و فروکتان می‌کند

نشان داد که دانه‌های شوید در مرحله شیری، بیشترین درصد و عملکرد اسانس را داشته و باگذشت زمان از درصد و عملکرد اسانس آن‌ها کاسته می‌شود. بر اساس گزارش رضائی چیانه (Rezaei-Chiyaneh, 2011)، بیشترین درصد اسانس رازیانه در اواسط پر شدن دانه حادث شد و با پیشرفت نمو بذری روی گیاه مادری میزان اسانس به طور میانگین حدود ۲۵ درصد کاهش یافت.

نتیجه‌گیری

بررسی سطوح مختلف تیمارهای آبیاری حکایت از تأثیر منفی کمبود رطوبت خاک بر صفات موردمطالعه در تحقیق حاضر دارد؛ اما اختلافات به وجود آمده بین سطوح مختلف تنفس کم‌آبی نشان‌دهنده قدرت سازگاری این گیاه با شرایط خشکی است. چراکه در شرایط تنفس ملایم رطوبتی عملکرد و اجزای عملکرد زیان کاهش چشمگیری را نشان ندادند؛ اما آنچه مسلم است با افزایش فاصله دور آبیاری از ۶۰ به ۱۸۰ میلی‌متر تبخیر از تشکیل تبخیر رشد اندام‌های هوایی، عملکرد دانه و اسانس به طور معنی‌داری کاهش یافتد. به طورکلی از نتایج این آزمایش چنین استباط می‌شود، از آنجایی که تیمار آبیاری پس از ۹۰ میلی‌متر تبخیر از تشکیل تبخیر نسبت به تیمار آبیاری پس از ۶۰ میلی‌متر تبخیر از تشکیل از نظر تولید دانه اختلاف معنی‌داری نداشت و زمان برداشت در مرحله خمیری عملکرد بالاتری را نشان داد. می‌توان، تیمار آبیاری ۹۰ میلی‌متر تبخیر از تشکیل و زمان برداشت در مرحله خمیری را جهت کاشت در منطقه و سایر مناطق مشابه توصیه نمود.

به دو تیمار بدون تنفس (شاهد) و تنفس شدید از درصد اسانس بالاتری برخوردار بودند که با نتیجه آزمایش حاضر مطابقت دارد. کاهش عملکرد اسانس درنتیجه کاهش رطوبت خاک ممکن است ناشی از اثر زیان‌بار تنفس آبی بر رشد و اندام رویشی گیاه باشد. چون عملکرد اسانس تابعی از درصد اسانس و عملکرد گیاه می‌باشد. گزارش شده، تنفس Eiasu کم‌آبی عملکرد اسانس را در گیاهان شمعدانی معطر (Ekrena et al., 2012; Motsa et al., 2006 Rezaei- Chiyaneh, 2011; (al., 2012) و رازیانه (Mirshekari et al., 2011) کاهش داده است.

از آنجایی که میزان اسانس و ترکیبات تشکیل‌دهنده آن در طول دوره نمو دانه‌ها در حال تغییر است (Telci et al., 2009)، شناخت مرحله‌ای از رسیدگی بذر که از بالاترین اسانس و ترکیبات مهم برخوردار باشد، می‌تواند سیار مهم تلقی شود (Bernath and Mihalik, 2001). نتایج تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که تولید اسانس در فعال‌ترین بخش در حال رشد صورت می‌گیرد و در طی دوره‌های بعدی و مراحل آخر رشد، تشکیل و تولید اسانس به حدی نیست که از دست دادن اسانس را از طریق مصرف، انتقال و تلفات تبخیری جبران نماید (Zehtab Salmasi et al., 2003; Sefidkon, 2007 Telci et al., 2003; Sefidkon, 2007) در دانه‌های گشنیز نشان دادند که میزان تجمع اسانس در مراحل اولیه پر شدن دانه نسبت به مراحل آخر رسیدگی بیشتر است و در مراحل آخر دوره رسیدگی میزان اسانس به طور معنی‌داری کاهش یافت. زهتاب سلماسی (Zehtab Salmasi et al., 2003) در آنیسون مشاهده نمود که بالاترین مقدار اسانس در مرحله مومی شدن دانه‌ها به دست می‌آید. مددی بناب (Madadi-Bonab, 2011)

منابع

- Agaei, A.H., Ehsanzadeh, P., 2011. Effect of irrigation regimes and nitrogen on the yield and some physiological parameters medicinal plant *Cucurbita pepo*. Iranian Journal of Horticultural Sciences. 4(3), 291-299. [In Persian with English summary].
- Alizadeh, A., Tavoosi, M., Enanloo, M., Naseri -Mahalati, M., 2006. Evaluation of irrigation treatments on yield and yield components of cumin. Iranian Journal of Crop Sciences. 1, 35-42. [In Persian with English summary].
- Bernath J., Mihalik, E., 2001. Regularities of the essential oil accumulation in developing fruits of fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) and its histological background. In: World Conference on Medicinal and Aromatic Plants, Budapest, Hungary, 8–11,
- Bettaieb I., Zakhama N., Aidi-Wannes N., Kchouk M.E., Marzouk, B., 2009. Water deficit effects on *Salvia officinalis* fatty acids and essential oils composition. Scientia Horticulturae. 120, 271-275.

- Eiasu B.K., Steyn J.M., Soundy, P., 2009. Rose-scented geranium (*Pelargonium capitatum* × *Pelargonium radens*) growth and essential oil yield response to different soil water depletion regimes. Agricultural Water Management. 96, 991–1000.
- Eiasu, B. K., Steyn, J. M., Soundy, P., 2012. Physiomorphological response of rose-scented geranium (*Pelargonium* spp.) to irrigation frequency. South African Journal of Botany. 78, 96–103.
- Ekrena, S., Sonmez, C., Ozcakal, E., Kurttas, Y. S. K., Bayram, E., Gurgulu, H., 2012. The effect of different irrigation water levels on yield and quality characteristics of purple basil (*Ocimum basilicum* L.). Agricultural water management. 109, 155–161.
- Ghasemi Siani, E., Fallah, S., Tadayyon, A., 2011. Study on yield and seed quality of *Plantago ovata* Forssk under different nitrogen treatments and deficit irrigation. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 27(3), 517-528. [In Persian with English summary].
- Golldani, M., Rezvani, P., 2005. Effects of different drought levels and planting date on yield and yield components of three chickpea (*Cicer arietinum* L.) cultivars in Mashhad. Iranian Journal of Field Crops Research. 2(2), 1-12. [In Persian with English summary].
- Heidari, N., Pouryousef, M., Tavakkoli, A., Saba, J., 2012. Effect of drought stress and harvesting date on yield and essential oil production of anise (*Pimpinella anisum* L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 28(1), 121-130. [In Persian with English summary].
- Hopkins, W. G., 1995. Introduction to Plant Physiology. John Wiley and Sons, Inc. New York, USA, 464p.
- Jamshidi, E., Ghalavand, A., Sefidkon, F., Golaph, E.M., 2012. Effects of different nutrition systems (organic and chemical) on quantitative and qualitative characteristics of Fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) under water deficit stress. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 28(2), 309-322. [In Persian with English summary].
- Khajeh, M., Yamini Y., Sefidkon F., Bahramifar, N., 2004. Comparison of essential oil composition of *Carum copticum* obtained by supercritical carbon dioxide extraction and hydrodistillation methods. Food Chemistry. 86, 587-591.
- Koocheki, A., Mokhtari, V., Taherabadi, S.h., Kalantari, S., 2011. The Effect of Water Stress on Yield, Yield Components and Quality Characteristics of *Plantago ovata* and *Plantago Psyllium*. Journal of Water and Soil. 25(3), 656-664. [In Persian with English summary].
- Laribi, B., Bettaieb, I., Kouki, K., Sahli, A., Mougou, A., Brahim, M., 2009. Water deficit effects on caraway (*Carum carvi* L.) growth, essential oils and fatty acids composition. Industrial Crops and Products. 30, 372-379.
- Madadi- Bonab, S., 2011. Effect of irrigation treatments and nitrogen fertilizer on yield and essential oil of dill (*Anethum graveolens* L.). Mcs. thesis, Department of Plant Eco-Physiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. [In Persian with English summary].
- Majnoon Hosseini, N., Davazdah-Emami, S., 2007. Crops and the Production of Medicinal Plants and Spices. Tehran University Publications. 300p. [In Persian].
- Mirshekari, B., Farahvash, F., 2011. Management of irrigation and nitrogen fertilizing in fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) as a medicinal plant under semi-arid conditions. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 27(4), 541-550. [In Persian with English summary].
- Mosavi- Nik, M., 2012. Effect of different levels of sulfur fertilization on yield and quality of medicinal plants of *Plantago psyllium*. Journal of Agroecology. 4(2), 170-182. [In Persian with English summary].
- Motsa, N.M., Soundy, P., Steyn, J.M., Learmonth, R.A., Mojela, N., Teubes, C., 2006. Plant shoot age and temperature effects on essential oil yield and oil composition of rose-scented geranium (*Pelargonium* sp.) grown in South Africa. Journal of Essential Oil Research. 18, 106–110.
- Mousavi, S.G.R., Seghatoleslami, M.J., Ansarinia, E., Javadi, H., 2011. The effect of water deficit stress and nitrogen fertilizer on yield and water use efficiency of *Calendula officinalis* L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 28 (3), 493-508. [In Persian with English summary].
- Munns, R., 1993. Physiological process limiting plant growth in saline soil: some dogma

- and hypotheses. *Plant Cell and Environment.* 16, 15-24.
- Norozphour, G., Rezvani-Mogadam, P., 2006. Effect of irrigation intervals and plant density on yield and essential oil of black seed beads (*Nigella sativa* L.). *Journal of Pajouhesh – VA- Sazandegi* (in Agronomy and Horticulture). 73, 133-138. [In Persian with English summary].
- Omidbaigi, R., 2009. Production and Processing of Medicinal Plants. (Volume I). Fifth edition, Publishing Astan Quds Razavi. 347p. [In Persian].
- Omidbaigi, R., Mahmoodi sourestani, M., 2010. Effect of Water Stress on Morphological Traits, Essential Oil Content and Yield of Anise Hyssop (*Agastache foeniculum* [Pursh] Kuntze). *Iranian Journal of Horticultural Sciences.* 41(2), 153-161. [In Persian with English Summary].
- Palizdar, M., Delkhosh, B., Shiranirad, A.H., Noormohammadi, G.h., 2013. Investigation on effects of irrigation regimes and potassium content on yield and yield components of safflower (*Carthamus tinctorius* L.). *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants.* 28(4), 628-645. [In Persian with English Summary].
- Pessarkli, M., 1999. Handbook of Plant and Crop Stress. Marcel Dekker. New York Inc, 697 p.
- Petropoulos, S. A., Daferera, D., Polissiou, M.G. Passam, H. C., 2008. The effect of water deficit stress on the growth, yield and composition of essential oils of parsley. *Scientia Horticulturae.* 115, 393-397.
- Rebey B. I., Jabri-Karoui, I., Hamrouni-Sellami, I., Bourgou, S., Limam, F., Marzouk, B., 2012. Effect of drought on the biochemical composition and antioxidant activities of cumin (*Cuminum cyminum* L.) seeds. *Industrial Crops and Products.* 36, 238–245.
- Rezaei- Chiyaneh, E., 2012. Effects of different irrigation treatments on essential oil accumulation, its composition and some eco-physiological traits in Fennel (*Foeniculum vulgare*). Ph.D. thesis Department of Plant of Eco-physiological, Faculty of Agriculture, university of Tabriz. [In Persian with English summary].
- Rezaei Chiyaneh, E., Zehtab Salmasi, S., Ghassemi Golezani, K., delazar, A., 2012. Effect of irrigation treatments on yield and yield components of three fennel (*Foeniculum vulgare* L.) landraces. *Journal of sustainable agriculture and production science.* 22(4), 58-70. [In Persian with English summary].
- Rezapor, A.R., Heidari, M., Galavil, M., Ramrodi, M., 2011. Effect of water stress and different amounts of sulfur fertilizer on grain yield, grain yield components and osmotic adjustment in *Nigella sativa* L. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants.* 27(3), 384-396. [In Persian with English summary].
- Sefidkon, F., 2007. Chemical and Industrial Preparation of Essential Oils. Publications Zavsh Tehran. 256p. [In Persian].
- Seghatoleslami, M.J., Mosavi, S.G., Barzegaran, T., 2011. Effect of irrigation levels and planting date on yield and water use efficiency of *Hibiscus sabdariffa* L. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants.* 29(1), 144-155. [In Persian with English summary].
- Soleymani, A., Moradi, M., Naranjani, L., 2011. Effects of the irrigation cut-off time in different growth stages on grain and oil yield components of autumn's canola cultivars in Isfahan region. *Journal of Water and Soil.* 25(3), 426-435. [In Persian with English summary].
- Soltani Gerdfaramarzi, M.K., Omidi, H., Habibi, H., Lebaschy, M.H., Zarezadeh, A., 2011. The effects of glycine betaine and drought stress on yield, yield components and essential oil in German chamomile genotypes in Yazd region. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants.* 27(2), 279-289. [In Persian with English summary].
- Telci, I., Bayram, E., Avci, B., 2006. Changes in yields, essential oil and linalool contents of *Coriandrum sativum* varieties (var. *vulgare* Alef. and var. *microcarpum* DC.) harvested at different development stages. *European Journal of Horticultural Science.* 71, 267–271.
- Telci, I., Demirtas, I., Sahin, A., 2009. Variation in plant properties and essential oil composition of sweet fennel (*Foeniculum vulgare* Mill) fruits during stages of maturity. *Industrial Crops and Products.* 30: 126-130
- Zehtab Salmasi, S., Javanshir, A., omidbaigi, R., Alyari, H., Ghassemi Golezani, K., 2003. Eco-physiological effects of irrigation and

sowing date on growth, yield and herb anise (*Pimpinella anisum*), Journal of sustainable

agriculture and production science. 4, 37-49.
[In Persian with English summary].